

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

Глоду настойка

Склад:

діюча речовина: настойка плодів глоду (Fructus Crataegi);

1 флакон містить настойки плодів глоду (Fructus Crataegi) (1:10) (екстрагент – етанол 70 %) 25 мл, 40 мл або 100 мл;

допоміжні речовини: відсутні

Лікарська форма. Настойка.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина жовтувато-коричневого кольору, допускається утворення осаду при зберіганні.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються у кардіології. Код АТХ С01Е В04.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини, що містяться у плодах глоду, посилюють кровообіг у коронарних судинах та судинах головного мозку, підвищують чутливість міокарда до дії серцевих глікозидів і зменшують його збудливість, що призводить до певного посилення скорочень серцевого м'яза.

Фармакокінетика. Препарат добре всмоктується при пероральному застосуванні. Ефект настає через 0,5 – 1 годину.

Клінічні характеристики.

Показання.

Функціональні розлади діяльності серцево-судинної системи (нейроциркуляторні дистонії), а також як допоміжний лікарський засіб при легких формах порушень серцевого ритму (миготлива аритмія, пароксизмальна тахікардія).

Протипоказання.

Індивідуальна гіперчутливість до компонентів препарату, виражені артеріальна гіпотензія і брадикардія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат посилює ефекти серцевих глікозидів, може посилювати дію снодійних, седативних, гіпотензивних засобів. Не рекомендується прийом із солями алкалоїдів у зв'язку з можливістю утворення небажаних комплексів. Не слід застосовувати препарат разом з антиаритмічними засобами третього покоління, а також із цизапридом.

Особливості застосування.

Препарат не рекомендується приймати під час їди, щоб уникнути взаємодії з компонентами їжі.

Застосування у період вагітності та годування груддю.

Оскільки до складу препарату входить етиловий спирт, настойку протипоказано застосовувати жінкам у період вагітності або

годування груддю. У разі необхідності застосування препарату слід припинити годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Препарат містить спирт! Препарат впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами, оскільки може викликати сонливість. Седативний ефект розвивається повільно протягом трьох тижнів.

Спосіб застосування та дози.

Глоду настойку приймати внутрішньо до їди. Якщо лікар не призначив іншу схему лікування, дорослим рекомендується приймати по 20 крапель настойки 3 рази на добу, дітям віком від 12 років – із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3 рази на добу до досягнення стабільного лікувального ефекту (нормалізація артеріального тиску, уповільнення серцебиття). Тривалість лікування визначають індивідуально.

Діти. Препарат застосовують дітям віком від 12 років.

Передозування.

Передозування призводить до зниження артеріального тиску. При значному перевищенні дози можливе виникнення сонливості, брадикардії, які вимагають припинення прийому препарату і застосування симптоматичної терапії.

Побічні реакції. Препарат, як правило, переноситься добре, проте у деяких хворих при індивідуальній підвищеній чутливості до компонентів препарату можливий розвиток алергічних реакцій (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри). Рідко спостерігається сонливість, значне уповільнення серцевого ритму.

Термін придатності. 4 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 мл у флаконах-крапельницях;

По 40 мл або по 100 мл у флаконах;

По 25 мл, по 40 мл або по 100 мл у флаконі, по 1 флакону у пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

Дочірнє підприємство «Агрофірма «Ян» приватного підприємства «Ян».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 13643, Житомирська обл., Ружинський район, с. Немиринці, вул. Леніна, 41.