

(Briroza)

1 : ; 2 ;
, , 1 , 1 , .
R,
GY2.
S01 05.

-2-
-1- 1000

2 , 4-6

(6) (3).

10 (C_{max} 0,2 % 2 0,06 /).
(2 10) 12
(AUC0 - 12 h) 0,31 / « 0,23 » /

In vitro in vivo 3 ; 29 % 2

/ 3 - 17

1 .

, 4

vitro

5 ;

(75 %)

in

P450.

C_{max} AUC

0,08

%, 0,2 % 0,5 %

C_{max} , AUC

(65)

3 (

)

(18).

(MAO),

).

MAO,

(

).

(

).

()

(

)

(

),

(

).

(12,7 %)

15

12

1

()2

1

()

5 - 15

():

():

-2-

().

(0,1-0,2 %)

6-24 .

22 – 25 %)

/

12,7 %

11,5 %

().

3- 9-

/1000);

(1/10);

(1/100 <1/10);

(1/1000 <1/100);

(1/10000 <1

(<1/10000).

().

(,) ,

(,) ,

().

: .
:

,

:
:

()

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.3

-28

5

;1

3

-

«

»,

/Adamed Pharma S.A., Poland.

200, Poland.

5, 95-200,

/ul. Marszałka Josefa Pilsudskiego 5, Pabianice. 95 –