

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

АНТИГРИПІН ДИТЯЧИЙ
(ANTIGRIIPPIN BABY)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 10 г гранул містять China 30CH 20 мг (Хіни 30CH 20 мг), Ferrum phosphoricum 50CH 20 мг (Феруму фосфорикуму 50CH 20 мг), Belladonna 1000CH 20 мг (Беладони 1000CH 20 мг), Arnica 30CH 20 мг (Арніки 30CH 20 мг), Arsenicum album 1000CH 20 мг (Арсенікуму альбуму 1000CH 20 мг);
допоміжні речовини: крупка цукрова.

Лікарська форма. Гранули.

Гранули однорідні за кольором, кулеподібної форми, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору, без запаху.

Назва і місцезнаходження заявника.

ЗАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Україна, 04053, м. Київ, вул. Тургенівська, 76/78.

Назва і місцезнаходження виробника.

ЗАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Україна, 37500, Полтавська обл., м.Лубни, вул. Грушевського, 19

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Властивості зумовлені поєднанням рослинних та мінеральних компонентів, що входять до складу препарату. Виявляє жарознижуючу, протизапальну, метаболічну, імуномодулюючу дію. Компоненти, що входять у комплекс, підібрані з урахуванням особливостей перебігу вірусних та бактеріальних інфекцій у дітей (схильність до гіпертермічних реакцій, судомних реакцій на фоні підвищення температури тіла, схильність до генералізації запальних процесів).

Антигрипін дитячий також показаний дорослим при тяжкому перебігу захворювань з вираженими симптомами інтоксикації та гіпертермії.

Показання для застосування.

- Симптоматична терапія при грипі, гострих респіраторних захворюваннях, інфекційно-запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів;
- профілактика грипу під час епідемії;
- гарячкові стани у дітей при прорізуванні зубів;
- профілактика гіпертермічних судомних реакцій.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Дитячий вік до 1 року.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Хворим на цукровий діабет перед застосуванням препарату слід проконсультуватися з лікарем.

При поєднанні з іншимі лікарськими засобами інтервал між їх прийомом має становити не менше 30 хв.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосування препарату можливе, якщо, на думку лікаря, очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Немає даних про негативний вплив препарату на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами.

Діти.

Антигрипін дитячий можна застосовувати дітям віком старше 1 року

Спосіб застосування та дози.

Дорослим і дітям старше 3 років

Під час хвороби призначають по 5 гранул під язик 3 рази на день до стійкого поліпшення стану.

Для профілактики під час епідемії грипу – 1 раз на день по

5 гранул.

Під час лихоманки – кожні 10-15 хвилин до покращення.

Гранули слід приймати під язик до повного розсмоктування за 15-20 хвилин до їди або через 1 годину після їди. При необхідності гранули розчинити у невеликій кількості води.

Дітям від 1 до 3 років гранули розчинити у невеликій кількості води з розрахунку 1 гранула на рік життя.

Передозування.

Не призводить до негативних наслідків та не потребує антидотної терапії.

Побічні ефекти.

У поодиноких випадках можливі алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Можна комбінувати з іншими лікарськими засобами та методами лікування.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С.

Упаковка.

По 10 г гранул у пеналі полімерному, в картонній пачці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.