

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

АЛАНТАН ПЛЮС

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 г мазі містить алантоїну 20 мг, декспантенолу (50 % розчин у пропіленгліколі) 50 мг;
допоміжні речовини: олія мінеральна, парафін білий м'який, ланолін, етилпарагідроксibenзоат (Е 214), вода очищена.

Лікарська форма. Мазь.

Мазь жовтого кольору гомогенної консистенції з характерним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

Фармацевтичне підприємство «Унія» Трудовий кооператив.
Вул. Хлодна 56/60, 00-872, Варшава, Польща.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що сприяють загоєнню (рубцюванню) ран. Код АТХ D03A X.

Дія препарату є результатом наявності двох компонентів: алантоїну та декспантенолу.

Алантоїн має протизапальну, стягувальну дію, пом'якшує та стимулює гранулювання епідермісу.
Декспантенол регулює водний баланс шкіри, підвищує рівень її пружності та еластичності.

Показання для застосування.

Лікування різноманітних ран, таких як: подряпини, невеликі рани шкіри, тріщини. Лікування опіків – сонячні опіки, а також опіки від радіотерапії, фототерапії. Догляд за сосками під час годування груддю. Запобігання опріlostям у немовлят. Догляд за подразненою та сухою шкірою. Застосування при надмірному кератозі шкіри долонь та стоп. Як допоміжний засіб при лікуванні atopічного дерматиту, алергічних екзем, виразок гомліки.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату. Гемофілія.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При застосуванні препарату слід уникати контакту з очима та потрапляння препарату в очі.

У разі появи симптомів подразнення шкіри у місці нанесення (почервоніння, свербіж), застосування препарату необхідно припинити і призначити симптоматичне лікування.

Препарат містить пропіленгліколь, що може спричинити подразнення шкіри.

Ланолін, що міститься у препараті, може викликати місцеву реакцію шкіри (контактний дерматит).

Етилпарагідроксibenзоат, що міститься у препараті, може спричинити алергічні реакції (можливі реакції сповільненого типу).

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Дані про застосування препарату у період вагітності відсутні. Тому застосування препарату у цей період можливо лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода.

Не наносити мазь на груди перед годуванням дитини грудним молоком.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Препарат застосовують дітям.

Спосіб застосування та дози.

Мазь рекомендується наносити на шкіру тонким шаром 1 - 2 рази на добу.

При запаленні та подразненні шкіри наносити на шкіру 2 - 3 рази на добу, у випадку порушення цілісності шкіри накладати на стерильну пов'язку 1 - 2 рази на добу до зникнення симптомів захворювання.

Тривалість лікування залежить від індивідуальних особливостей перебігу захворювання у пацієнта і визначається досягнутим терапевтичним ефектом та переносимістю препарату.

При догляді за немовлятами застосовувати препарат після кожної зміни пелюшок.

Передозування.

При застосуванні препарату згідно показань лікаря та способу застосування передозування не виявлено.

У разі випадкового проковтування мазі – симптоматична терапія.

Побічні ефекти.

Можливі реакції гіперчутливості, включаючи реакції з боку шкіри: контактний дерматит, алергічний дерматит, свербіж, еритема, екзема, висипання, кропив'янка, пухирці.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не встановлено.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 30 г мазі у тубі, по 1 тубі у картонній упаковці.

Категорія відпуску. Без рецепта.