

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ПОЛИСОРБ МП
(POLYSORB MP)

Состав лекарственного средства:

действующее вещество: высокодисперсный диоксид кремния 12 г.

Лекарственная форма. Порошок для приготовления суспензии.

Рыхлый порошок белого цвета без вкуса и запаха.

Название и местонахождение производителя.

Государственное предприятие «Джанкойско-Сивашский опытно-экспериментальный завод Института химии поверхности им. А.А. Чуйко Национальной академии наук Украины».

ул. Октябрьская, 82, г. Джанкой, АР Крым, Украина, 96100

Фармакотерапевтическая группа. Энтеросорбенты. Код АТС А07В С10.

Препарат сорбционного действия. Связывает путем адсорбции и выводит из организма токсины экзогенного и эндогенного происхождения, пищевые и бактериальные аллергены, микробные эндотоксины, токсичные продукты, образующиеся в процессе распада белков в кишечнике. Содействует транспорту из внутренней среды организма (кровь, лимфа, интерстиции) в желудочно-кишечный тракт за счет концентрационных и осмотических градиентов разнообразных токсических продуктов, в том числе средних молекул, олигопептидов, аминов и других веществ с последующим выведением их из организма. Препарат практически не всасывается в кишечнике.

Показания к применению. Лечение острых кишечных заболеваний, сопровождающихся диарейным синдромом (сальмонеллез, пищевые токсикоинфекции), а также при комплексном лечении вирусных гепатитов А и В.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к кремнию диоксиду; детский возраст до 1 года, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, язвы и эрозии кишечника, непроходимость кишечника.

Надлежащие меры безопасности при применении.

Запрещается употребление сухого порошка внутрь.

Полисорб МП при применении его в комплексной терапии следует принимать за час до приема других пероральных лекарственных препаратов и за их возможной адсорбции и соответственно – снижения эффективности.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

В связи с отсутствием данных о применении Полисорба МП во время беременности или кормления грудью применение препарата не рекомендуется.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Не влияет.

Дети.

Препарат не назначают детям в возрасте до 1 года.

Способ применения и дозы. Полисорб МП принимают в виде суспензии для внутреннего употребления. Суспензию готовят путем внесения в стакан с нейтральной негазированной или охлажденной кипяченой водой 1 столовой ложки (1,2 г) порошка для взрослых и 1 чайной ложки (0,6 г) – для детей. Полученную суспензию тщательно перемешать. Подготовленную суспензию препарата принимают внутрь за час до еды или приема лекарственных средств. Суточная доза для взрослых и детей старше 7 лет составляет 12 г, по необходимости можно увеличить до 24 г; для детей от 1 до 7 лет доза составляет 150-200 мг на 1 кг массы тела. Суточную дозу распределяют на 3-4 приема.

Максимальная разовая доза препарата не должна превышать половины суточной дозы. При острых кишечных заболеваниях взрослым и детям старше 7 лет лечение целесообразно начинать с максимальной разовой дозы – 6 г, препарат принимать 2-3 раза в сутки. Если больной не может принимать препарат самостоятельно, суспензия вводится в желудок через зонд.

При острых кишечных заболеваниях курс лечения составляет 3-5 дней, при необходимости курс может быть продлен до 10-15 дней.

Курс лечения при вирусных гепатитах составляет 7-10 дней.

Передозировка. О случаях передозировки сообщений не было.

Побочные эффекты. В единичных случаях возможен запор.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

При одновременном применении Полисорба МП с ацетилсалициловой кислотой усиливались процессы дезагрегация тромбоцитов.

В комплексной терапии с никотиновой кислотой и симвастатином Полисорб МП проявляет синергическое действие – способствует снижению уровня атерогенных фракций липидного спектра крови и повышению уровня холестерина липопротеинов высокой плотности.

Применение Полисорба МП при интракорпоральной сорбционной детоксикации в сочетании со стандартными растворами антисептиков (фурациллин, бифуран, трифуран, хлоргексидина биглюконат и др.) повышает эффективность лечения гнойно-воспалительных заболеваний.

Срок годности. Сухого порошка – 3 года; приготовленной суспензии – 24 часа при условии хранения при температуре 8-15 °С.

Конечную дату срока годности смотрите на этикетке.

Запрещается употреблять лекарственное средство после истечения срока годности.

Условия хранения. Хранить в закрытых бутылках при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка. По 12 г порошка в стеклянных бутылках объемом 250 мл.

Категория отпуска. Без рецепта.