

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ГІДРОКОРТИЗОН
(HYDROCORTISONE)

Склад лікарського засобу:

Діюча речовина: hydrocortisone; 17- оксикортикостерон;
1 г мазі містить гідрокортизону 10 мг;
допоміжні речовини: парафін білий м'який.

Лікарська форма. Мазь очна.

Гомогенна мазь білого або майже білого кольору.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються в офтальмології. Протизапальні засоби. Кортикостероїди.

Код ATCS01B A02.

Фармакологічні властивості.

Гідрокортизон – гормон кори наднирників. Має протизапальні, протиалергічні, протинабрякові властивості, зменшує свербіж. Механізм дії пов'язаний із здатністю пригнічувати фосфоліпази А₂, порушувати синтез простагландинів, активацію тканинних кінінів. Гідрокортизон гальмує міграцію лейкоцитів та лімфоцитів у вогнище запалення, перешкоджає розвитку запальної реакції, зменшує ексудацію та проникність капілярів, має антиметаболічну дію. Гальмує розвиток сполучної тканини, відкладення колагену і рубцювання.

Гідрокортизон у невеликій кількості проникає через інтактну рогівку до передньої камери ока. При запаленні або ушкодженні рогівки імовірність пенетрації зростає і залежить від анатомічних особливостей рогівки.

Показання для застосування. Сезонні алергічні кон'юктивіти, паренхіматозні кератити, епісклерити, екзематозні кератокон'юктивіти, гострі та хронічні іридоцикліти, увеїти.

Протипоказання. Герпетичні кератити, гнійні, вірусні туберкульозні, грибкові захворювання очей; первинна глаукома, порушення цілісності епітелію в місцях травматичних уражень рогівки.

Особливі застереження. Не застосовувати без перерви більше 2 тижнів. За необхідності застосування у пацієнтів з відкрито- або закритокутовою глаукомою, лікування проводять під контролем внутрішньоочного тиску.

Необхідно уникати носіння контактних лінз у період застосування мазі.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

При вагітності та в період годування груддю застосування мазі очної Гідрокортизону можливе протягом не більше 7 – 10 днів за умов, якщо очікуваний лікувальний ефект суттєво перевищує ризик для плода та немовляти.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

У період лікування слід утриматись від такої діяльності внаслідок можливого подразнення в місці застосування мазі.

Діти.

Препарат не застосовують дітям.

Спосіб застосування та дози. Застосовують зовнішньо або субкон'юнктивально дорослим.

Звичайно приблизно 1 см мазі вводять у кон'юнктивальний мішок 2 – 3 рази на добу протягом 2 тижнів.

Перед застосуванням мазі необхідно ретельно вимити руки. Після нанесення мазі – заплющити очі на 1 – 2 хв. Курс безперервного лікування не повинен бути більшим за 2 тижні, потім необхідно зробити перерву.

Передозування. Посилення симптомів побічної дії.

Побічні ефекти. Свербіж та печіння в місці застосування, алергічні реакції (контактний дерматит, екзема повік); при тривалому застосуванні (понад 3 – 6 тижнів) – розвиток стероїдної глаукоми з можливим ураженням зорового нерва; при багаторічних повторних курсах терапії – формування задньої субкапсулярної катаракти, екзофтальм.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не рекомендується одночасне застосування із іншими офтальмологічними препаратами.

Термін придатності. 5 років

Умови зберігання. Зберігати в недоступному для дітей, сухому, захищеному від світла місці, при температурі не вище 25 °С.

Упаковка. По 5 г у тубі. По 1 тубі у картонній коробці.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник. «Галеніка а.д.».

Адреса. Батайнічкі друм 6.б., 11080 Белград, Сербія.