

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

САЛІН

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 мл препарату містить 6,5 мг натрію хлориду;

допоміжні речовини: натрію гідрофосфат дигідрат, натрію дигідрофосфат дигідрат, бензалконію хлорид, вода очищена.

Лікарська форма. Спрей назальний.

Прозора, безбарвна рідина без запаху.

Назва і місцезнаходження виробника. Istituto De Angelis S.p.A., 50066 Reggello (Firenze), Loc. Prullin. 103/c, Italy / Istituto De Angelis S.r.l., 50066 Reggello (FI), Loc. Prullin. 103/c, Italy.

Назва і місцезнаходження заявника. Байер Консьюмер Кер АГ, Петер Меріан-Штрассе 84, 4052 Базель, Швейцарія / Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-Strasse 84, 4052 Basel, Switzerland.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа. Код АТС R01A X10.

Ефективно зволожує слизову оболонку носа, розріджує густий слиз, розм'якшує сухі лусочки у носі і сприяє їх легкому видаленню. Високоочищений стабілізований 0,65 % розчин натрію хлориду максимально відповідає природному назальному секрету. Буферні речовини, що входять до складу Саліну, наближують рН розчину до рН природної секреторної рідини слизової оболонки носа і підтримують цей показник на постійному рівні.

Салін покращує нюх та транспортну функцію миготливого епітелію, сприяє відновленню носового дихання, скорочує період реабілітації, дозволяє знизити дозу і частоту використання судинозвужувальних засобів місцевої дії.

Показання для застосування. Застосовувати для немовлят, дітей та дорослих:

- для гігієнічного догляду за порожниною носа, профілактики і комплексного лікування захворювань слизової оболонки носа та придаткових пазух, що супроводжуються сухістю слизової оболонки носа або утворенням слизу (атрофічний, алергічний, інфекційний, медикаментозний риніт);
- як допоміжний засіб при застосуванні локальних судинозвужувальних засобів;
- для усунення сухості слизової оболонки носа, зумовленої роботою кондиціонерів, у тому числі автомобільних, або радіаторів центрального опалення, під час повітряних перельотів;
- після операційних втручань у порожнині носа та носових пазухах.

Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Щоб уникнути розповсюдження інфекції, рекомендується індивідуальне використання флакона.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Без обмежень.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Дітям застосовувати під наглядом дорослих.

Спосіб застосування та дози. Впорскувати всередину порожнини носа шляхом швидкого натискання на пружний корпус флакона.

Немовлятам і дітям застосовувати по одному, дорослим – по два розпилення в кожную ніздрю, 3–4 рази протягом доби. При вертикальному положенні флакона розчин виділяється з нього у вигляді спрею, у горизонтальному – у вигляді струменя рідини, у перевернутому положенні – у вигляді крапель.

Передозування. Випадки передозування, а також будь-які токсичні або системні реакції у результаті застосування препарату Салін не описані.

Побічні ефекти. У осіб з індивідуальною непереносимістю компонентів препарату можливі алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не описані.

Термін придатності. 3 роки. Після відкриття флакона термін придатності – 3 місяці.

Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 30 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. Пластиковий флакон ємністю 30 мл з ковпачком та конічним розподільником у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.