

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**БОН-АПЕТИТ**  
**(BON-APETIT)**

**Склад лікарського засобу:**

*діючі речовини:* 5 мл сиропу містять екстракт (1 : 8) із суміші лікарських рослин: плодів винограду (*Vitis vinifera*) 130 мг, листя столітника (*Aloe vera*) 130 мг, кори егле мармеладного (*Aegle marmelos*) 10 мг, коріння арніки крупноцвітної (*Premna mucronata*) 10 мг, кориороксилнома індійського (*Oroxylum indicum*) 10 мг, коригмелини (*Gumliana arboria*) 10 мг, користереоспермума (*Stegospermum suaveolens*) 10 мг, всієї рослини десмодіума (*Desmodium gargeticum*) 10 мг, всієї рослини пришнапарні (*Uraria picta*) 10 мг, всієї рослини пасльону індійського (*Solanum indicum*) 10 мг, всієї рослини пасльону (*Solanum surattense*) 10 мг, плодів якірців сланких (*Tribulus terrestris*) 10 мг, пагонів вітанії снодійної (*Withania somnifera*) 50 мг, всієї рослини спаржі гроноподібної (*Asparagus racemosus*) 25 мг, плодів терміналії чебули (*Terminalia chebula*) 12,5 мг, плодів терміналії белерики (*Terminalia belerica*) 12,5 мг, плодів амлі (*Emblica officinalis*) 12,5 мг, пагонів тиноспори сердцелистої (*Tinospora cordifolia*) 25 мг, коріння солодки голої (*Glycyrrhiza glabra*) 25 мг, плодів перцю довгого (*Piper longum*) 4,15 мг, кореневища імбиру лікарського (*Zingiber officinale*) 4,15 мг, плодів перцю чорного (*Piper nigrum*) 4,15 мг, кори терміналії арджуни (*Terminalia arjuna*) 5 мг, всієї рослини симплокоса кистьового (*Symplocos racemosa*) 5 мг, насіння марени сердцелистої (*Rubia cordifolia*) 10 мг, насіння кмину (*Carum roxburghianum*) 5 мг, плодів коріандрю посівного (*Coriandrum sativum*) 5 мг, коріння куркуми довгої (*Curcuma longa*) 10 мг, коріння гедихіуму колосистого (*Hedy chium spicatum*) 5 мг, плодів кмину кминового (*Cuminum suminum*) 7,5 мг, бруньок гвоздики (*Syzygium aromaticum*) 9,5 мг;

*допоміжні речовини:* ароматизатор малиновий (кетон малини, етилмантол), цукор кондитерський, натрію бензоат (Е 211), натрію метилпарабен (Е 219), натрію пропілпарабен (Е 217), вода очищена.

**Лікарська форма.** Сироп.

Сиропоподібна рідина темно-коричневого кольору з характерним запахом, солодка на смак.

**Назва і місцезнаходження виробника.** Сурья Хербел Лімітед.

С-33, Сектор-59, Нойда, Гаутам Будха Нагар, Індія.

**Назва і місцезнаходження заявника.** АМЕРІКЕН НОРТОН КОРПОРЕЙШН.

1570 Сан-Томас Еквіно Роуд, Сан-Хосе, СА 95130, США.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що підвищують апетит. Код АТС А15.

Сироп Бон-Апетит підвищує апетит, збуджує смакові рецептори. Препарат нормалізує процес травлення, стимулює перистальтику кишечника; усуває прояви диспепсії, сприяє нормалізації обміну речовин та стимулює неспецифічну резистентність організму. Бон-Апетит нормалізує виділення шлункового соку і діяльність підшлункової залози. Опосередковано сприяє відновленню порушеної флори кишечника.

**Показання для застосування.** Симптоматичне лікування зниження або відсутності апетиту соматичного та психогенного походження у дітей та дорослих. Етап підготовки переходу від штучного харчування до фізіологічного. У складі комплексної терапії при порушенні процесів травлення внаслідок ендогенних та екзогенних факторів (дисбіоз будь-якої етіології, стресові фактори, нерегулярне та незбалансоване харчування).

**Противпоказання.** Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату.

**Особливі застереження.** Хворим на цукровий діабет, які приймають сироп Бон-апетит, слід враховувати, що в ½ чайної ложки (2,5 мл) препарату міститься 1,43 г цукру, що еквівалентно 0,14 хлібній одиниці; у одній чайній ложці (5 мл) препарату міститься 2,85 г цукру, що еквівалентно 0,28 хлібній одиниці; у двох чайних ложках (10 мл) препарату міститься 5,7 г цукру, що еквівалентно 0,57 хлібній одиниці.

Якщо протягом 8 тижнів не спостерігається стійкий ефект, рекомендується звернутися до лікаря.

Препарат слід застосовувати після визначення причин відсутності апетиту для виключення органічної патології шлунково-кишкового тракту (врождені вади, мальформація кишечника), гострих хірургічних захворювань черевної порожнини, гострих інфекційних захворювань.

Не допускається вживання сиропу одночасно з алкоголем та/або з кавою.

**Застосування в період вагітності або годування груддю.** Безпека та ефективність застосування Бон-Апетиту у жінок у період вагітності та годування груддю не досліджені, тому цій категорії пацієнтів препарат можна застосовувати тільки за призначенням лікаря. Препарат призначають з урахуванням співвідношення ризик/користь.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.** Немає даних щодо негативного впливу на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами.

**Діти.** Не рекомендується застосовувати дітям віком до 4 років, оскільки безпека та ефективність Бон-Апетиту у пацієнтів цієї вікової категорії не досліджені.

**Спосіб застосування та дози.** Препарат приймають внутрішньо за 15 – 30 хв до їди, запиваючи невеликою кількістю води або молока, не більше 4 разів на день. Дозування сиропу здійснюють за допомогою чайної ложки. Дітям віком 4 – 7 років застосовують по 2 – 3 мл (½ чайної ложки) препарату за один прийом; дітям віком 7 – 12 років – 2,5 – 5 мл (½ – 1 чайна ложка) препарату за один прийом; дорослим та дітям старше 12 років – 5 – 10 мл (1 – 2 чайні ложки) препарату за один прийом. Тривалість лікування залежить від характеру і вираженості порушення апетиту, супутньої терапії, досягнутого ефекту.

**Передозування.** Випадки передозування не спостерігалися.

**Побічні ефекти.** Зазвичай добре переноситься. У поодиноких випадках можуть з'явитися алергічні реакції. У разі появи будь-яких небажаних реакцій необхідно порадитися з лікарем щодо подальшого застосування препарату.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Не досліджена.

**Термін придатності.** 3 роки. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.** Зберігати в захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

**Упаковка.** По 100 мл сиропу у флаконах; по 1 флакону у картонній коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.