

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

М'ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ НАСТОЙКА

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 флакон містить настойки листя м'яти перцевої (1 : 20) 25 мл;

допоміжна речовина: етанол 70 %.

Лікарська форма. Настойка.

Прозора рідина зеленого кольору із запахом та смаком м'яти перцевої.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПАТ «Ліки Кіровоградщини».

Україна, 25014, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Районна, 1.

Фармакотерапевтична група.

Протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту. Код АТС А04А D20**.

Олія м'яти перцевої (містить до 70 % ментолу та його ефірів) та інші біологічно активні речовини, що містяться в листі м'яти перцевої (кетон-ментон, олеанолова та урсолова кислоти, флавоноїдні глікозиди), стимулюючи чутливі рецептори слизових оболонок ротової порожнини та шлунка, рефлекторним шляхом зменшують відчуття нудоти і запобігають блюванню, а також чинять помірну спазмолітичну, заспокійливу та жовчогінну дію.

Показання для застосування.

Нудота, блювання, розлади травлення, стенокардія, невралгічний біль.

Протипоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Бронхіальна астма, спазмофілія. Період вагітності і годування груддю. Дитячий вік до 12 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Відсутні.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат не застосовують у період вагітності і годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Оскільки до складу препарату входить етанол, він може впливати на здатність керувати транспортними засобами та працювати з потенційно небезпечними механізмами.

Діти.

Ефективність і безпека застосування препарату дітям до 12 років не встановлені. Тому не рекомендується його застосовувати цій віковій категорії пацієнтів.

Спосіб застосування та дози.

Призначають внутрішньо до їди. Дорослим призначають по 10 - 15 крапель настойки 3 - 4 рази на добу. Дітям старше 12 років призначають із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя.

Тривалість лікування залежить від перебігу захворювання та індивідуальної чутливості до препарату.

Передозування.

Повідомлення відсутні.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції (почервоніння шкіри, висипи, свербіж).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не відома.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі від 8 до 15 °С в захищеному від світла місці.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.