

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**КРУШИНИ КОРА**  
**(FRANGULAECORTEX)**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* крушини кора.

**Лікарська форма.** Кора.

*Подрібнена сировина:* шматочки кори різної форми. Колір кори з зовнішньої сторони – сірувато-коричневий або темно-коричневий, з внутрішньої – оранжево-коричневий, червонувато-коричневий або темно-червоний;

*порошок крупний:* шматочки кори різної форми сірувато-коричневого, темно-коричневого, оранжево-коричневого, червонувато-коричневого, темно-червоного кольору.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ПрАТ «Ліктрави».

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21

**Фармакотерапевтична група.** Проносні засоби. Код АТС А06А В07.

Біологічно активні речовини препарату чинять м'яку проносну дію, механізм якої полягає у посиленні перистальтики товстої кишки, не подразнюючи слизової оболонки і не впливаючи на тонкий кишечник. Послаблююча дія настає через 8-12 годин після приймання.

**Показання для застосування.** Атонія кишечника, звичні запори.

**Протипоказання.** Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Запори неврогенного та ендокринного походження, спастичні запори, кишкова непрохідність, кровотечі, синдром гострого живота, апендицит, гострий гастроентероколіт, інші запальні процеси у черевній порожнині, гострі пропасні стани.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Тривалий прийом препарату призводить до звикання та ослаблення або відсутності проносного ефекту. Щоб запобігти звиканню, доцільно чергувати з іншими проносними засобами.

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Протипоказано.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.*

Не впливає.

*Діти.* Застосування препарату рекомендується дітям старше 12 років.

**Спосіб застосування та дози.** 1 столову ложку кори помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 30 хв. Охолодити при кімнатній температурі 10 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Застосовувати у теплом вигляді дорослим по 1/2 склянки на ніч, дітям старше 12 років – по 1/4–1/3 склянки на ніч. Перед застосуванням відвар збовтати. 2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 15-20 хв. Застосовувати у теплом вигляді дорослим по 100 мл на ніч, дітям старше 12 років – по 1/4–1/3 склянки (50-60 мл) на ніч.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

**Передозування.** При передозуванні можливі колікоподібний біль у животі, тенезми, відчуття дискомфорту. При появі вказаних симптомів слід припинити прийом препарату. Лікування – симптоматичне.

**Побічні ефекти.** При тривалому застосуванні можуть розвинутися: діарея з метаболічними порушеннями, дегідратація, зниження функції ферментів кишечника, атонія товстого кишечника, колікоподібний біль, алергічні реакції.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**Невідома.

**Термін придатності.** 5 років.

*Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці*

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С. Приготовлену водну витяжку – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

**Упаковка.** По 75 г або по 100 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 2.5 г у фільтр-пакетах  
упаковці № 20.

в

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению препарата**  
**КРУШИНЫ КОРА**  
**(FRANGULAE CORTEX)**

**Состав лекарственного средства:**

*действующее вещество:* крушины кора.

**Лекарственная форма.** Кора.

*Измельченное сырье:* кусочки коры различной формы. Цвет коры с наружной стороны – серовато-коричневый или темно-коричневый, с внутренней – оранжево-коричневый, красновато-коричневый или темно-красный;

*порошок крупный:* кусочки коры различной формы серовато-коричневого, темно-коричневого, оранжево-коричневого, красновато-коричневого, темно-красного цвета.

**Название и местонахождение производителя.**

ЧАО «Лектравы».

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.

**Фармакотерапевтическая группа.** Слабительные средства. Код АТС А06А В07.

Биологически активные вещества препарата оказывают мягкое слабительное действие, механизм которого заключается в усилении перистальтики толстой кишки, не раздражая слизистую оболочку и не оказывая действия на тонкий кишечник. Слабительное действие наступает через 8-12 часов после приема.

**Показания к применению.** Атония кишечника, привычные запоры.

**Противопоказания.** Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Запоры неврогенного и эндокринного происхождения, спастические запоры, кишечная непроходимость, кровотечения, синдром острого живота, аппендицит, острый гастроэнтероколит, другие воспалительные процессы в брюшной полости, острые лихорадочные состояния.

**Надлежащие меры безопасности при применении.**

Длительный прием препарата приводит к привыканию и ослаблению или отсутствию слабительного эффекта. Во избежание привыкания, целесообразно чередовать с другими слабительными средствами.

**Особые предостережения.**

***Применение в период беременности или кормления грудью.***

Противопоказано.

***Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.***

Не влияет.

***Дети.*** Применение препарата рекомендуется детям старше 12 лет.

**Способ применения и дозы.** 1 столовую ложку коры поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 30 мин. Охладить при комнатной температуре 10 мин, процедить, остаток отжать в процеженный отвар. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде взрослым по 1/2 стакана на ночь, детям старше 12 лет – по 1/4-1/3 стакана на ночь. Перед применением отвар взболтать.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 100 мл кипятка, закрыть и настаивать 15-20 мин. Принимать в теплом виде взрослым по 100 мл на ночь, детям старше 12 лет – по 1/4-1/3 стакана (50-60 мл) на ночь.

Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

**Передозировка.** При передозировке возможны коликообразная боль в животе, тенезмы, ощущение дискомфорта. При появлении указанных симптомов следует прекратить прием препарата. Лечение – симптоматическое.

**Побочные эффекты.** При длительном применении могут развиваться диарея с метаболическими нарушениями, дегидратация, понижение функции ферментов кишечника, атония толстого кишечника, коликообразная боль, аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.** Неизвестно.

**Срок годности.** 5 лет.

*Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.*

**Условия хранения.**

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С. Приготовленное водное извлечение – при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

**Упаковка.**

По 75 г или по 100 г в пачках с внутренним пакетом, по 2.5 г в фильтр-пакетах в упаковке № 20.

**Категория отпуска.** Без рецепта.