

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

А-ЦЕРУМЕН
(A-CERUMEN)

Склад лікарського засобу:

активні речовини: 100 г препарату містять ТЕА-кокоїлгідролізований колаген – 20 г; кокобетаїн – 6 г; ПЕГ 120-метилглюкозодиолеат – 1,5 г;

допоміжні речовини: феноксиетанол-парабен(феноксїетанол метилпарабенЕ218, бутилпарабен пропілпарабенЕ216, стилпарабен Е214, ізобутилпарабен), тетранатрієваясіль ЕДТА, вода очищена.

Лікарська форма. Розчин вушний.

Світло-жовтуватого кольору, трохи в'язкий прозорий розчин, що піниться, без запаху.

Назва і місце знаходження виробника.

Лабораторії ЖІЛЬБЕР, Франція

928, Авеню Генерала де Голя, 14200 Ерувіль Сент-Клер, Франція/

Laboratoires Gilbert, France

928 Avenue du General de Caulle, 14200 Herouville Saint-Clair, France.

Фармакотерапевтична група. Отологічні препарати та інші засоби, що застосовуються в отології. Код АТС S02D.

За рахунок поверхневоактивної дії сурфактантів що входять до складу препарату, А-Церуменрозчиняє та попереджає утворення сірчаних пробок у зовнішньому слуховому проході.

Показання для застосування.

- Для розчинення сірчаних пробок зовнішнього слухового проходу;
- профілактика накопичення вушної сірки;
- регулярна гігієна вух.

Протипоказання.

- Підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату;
- перфорація барабанної перетинки;
- хворим, які страждають вушною інфекцією;
- хворим, які мають шунт у барабанній перетинці.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Перед застосуванням препарату маленьким дітям необхідно проконсультуватися з лікарем.

Після розкриття флакона препарат необхідно використати протягом 24 годин.

Не проштовхувати наконечник глибоко у слуховий прохід, щоб уникнути подразнення.

Якщо відзначається болісне відчуття у вусі, перед застосуванням слід проконсультуватися з лікарем.

Слід запобігати контакту препарату з очима. Не приймати внутрішньо.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Даних немає.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Препарат застосовують дітям від 2,5 років.

Спосіб застосування та дози.

Препарат застосовують дітям від 2,5 року та дорослим.

Для профілактики накопичення вушної сірки та регулярної гігієни вух: 2 рази на тиждень.

Для видалення вушних пробок: 2 рази на добу (вранці та ввечері) протягом 3-4 днів.

Закапувати половину вмісту одноразового флакона у кожне вухо. Тримати приблизно 1 хвилину. Після процедури промити зовнішній слуховий прохід 0,9 % розчином натрію хлориду.

Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально.

Передозування. Випадків передозування не відзначено.

Побічні ефекти. Можливі реакції підвищеної чутливості до компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат системно не впливає на організм, взаємодія з іншими лікарськими засобами не відзначена. Можна застосовувати з іншими лікарськими засобами у складі комбінованої терапії.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 30С.

Упаковка.

По 2 мл у одноразовому флаконі-крапельниці. По 5 флаконів у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.