

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
АРНІКА-ХЕЕЛЬ
(ARNICA-HEEL[®])

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 100 г препарату містять: Arnica montana D3 – 5 г, Bryonia D4 – 5 г, Acidum benzoicum e resina D3 – 5 г, Colchicum autumnale D4 – 5 г, Mercurialis perennis D3 – 5 г, Eupatorium cannabinum D4 – 5 г, Lycopersicon lycopersicum D3 – 5 г, Echinacea D3 – 5 г, Rhus toxicodendron D6 – 10 г, Eucalyptus globulus D4 – 10 г, Baptisia tinctoria D4 – 10 г, Solanum nigrum D4 – 10 г, Solanum dulcamara D4 – 10 г, Apis mellifica D4 – 10 г;

допоміжні речовини: етанол 96 %, вода очищена.

Препарат містить 35 % об. етанолу 96 %.

1 мл препарату містить 21 краплю.

Лікарська форма.

Краплі оральні.

Прозорий розчин ледь світло-жовтого кольору із запахом етанолу та слабким запахом бензойної кислоти.

Назва і місцезнаходження виробника.

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмБХ.

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Показання для застосування.

Гострі та хронічні захворювання із вираженим больовим та гарячковим синдромом (бактеріального та вірусного походження): бронхіт, пневмонія, пієлонефрит, цистит, уретрит, міокардит, ендокардити, ревматизм, ревматоїдні артрити, гепатити, синовіїти, тендовагініти; захворювання артерій та вен.

Протипоказання.

Вагітність. Підвищена чутливість до суміші отруйного, токсичного та до будь-якого компонента препарату.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Не застосовують.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Препарат містить етанол, що слід враховувати при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Діти. Через недостатність належного задокументованого досвіду застосування препарату у педіатричній практиці, даний лікарський засіб не рекомендовано застосовувати дітям віком до 18 років.

Спосіб застосування та дози.

Разова доза: дорослим і дітям віком від 18 років – 10 крапель 3 рази на добу за 15 – 20 хвилин до їди або через годину після їди. Краплі розчинити у 10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті (можна не розчиняти, а одразу капати під язик).

Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально.

Передозування.

Не відмічалось.

Побічні ефекти.

У поодиноких випадках можуть виникати шлунково-кишкові розлади або алергічні шкірні реакції; в тому числі через кілька днів після застосування препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не відома.

Термін придатності.

5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці

Упаковка.

Картонна коробка містить скляний флакон-крапельницю по 30 мл.

Категорія відпуску.

Без рецепта.