

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
СЕНАЛЕКС
(SENALEX)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: коричневі або темно-коричневі неоднорідні за кольором з сірими та коричневими вкрапленнями, плоскі, круглі таблетки зі скошеними краями та лінією розділу з однієї сторони;

склад: 1 таблетка містить сухого екстракту листя сени (олександрійського листя) в перерахуванні на сенозиди А і В у вигляді кальцієвих солей – 13,5 мг;

допоміжні речовини: лактоза, крохмаль кукурудзяний, тальк, натрію крохмальгліколят, кремнію діоксид колоїдний, натрію кроскармелоза.

Форма випуску. Таблетки.

Фармакотерапевтична група. Проносні засоби.

Код АТС А06А В06.

Фармакологічні властивості. *Фармакодинаміка.* Проносний препарат рослинного походження, містить екстракт олександрійського листя, діюча речовина якого – сенозиди А+В – є похідними діаптрону. Стимулює перистальтику товстої кишки і гальмує всмоктування з неї рідини, збуджує нормальні випорожнення через 6-10 годин. Вибірково діє на ободову кишку, поновлює нормальне функціонування кишечника, не призводить до звикання і не впливає на травлення. Сеналекс добре переноситься пацієнтами, у зв'язку з низьким вмістом смолистих речовин. Не чинить подразнювальної дії на кишечник.

Фармакокінетика. Дія препарату Сеналекс є сукупною дією його компонентів, тому проведення кінетичних спостережень не є можливим; усі разом компоненти не можуть бути простежені за допомогою маркерів і біодосліджень. З тієї ж причини неможливо виявити і метаболіти препарату.

Показання для застосування. Запори, спричинені гіпотонією і млявою перистальтикою товстого кишечника, регулювання випорожнень при геморої, проктиті, анальних тріщинах.

Спосіб застосування та дози. Застосовують внутрішньо дорослим 1 раз на добу. Приймають по 1 таблетці ввечері перед сном, запиваючи водою або будь-яким напоєм.

За відсутності ефекту дозу можна збільшити до 2 таблеток (максимальна добова доза).

Якщо після застосування максимальної дози протягом 3 днів дефекація не відбувається, необхідно провести медичне обстеження.

Побічна дія. Проносна дія препарату може супроводжуватися колікоподібним болем у животі, метеоризмом. При тривалому застосуванні можлива втрата з калом електролітів (переважно калію), альбумінурія, гематурія, відкладення меланіну в слизовій оболонці кишечника, нудота, блювання, діарея, знебарвлення сечі, шкірні висипання, судоми, судинний колапс. У такому разі необхідно припинити застосування препарату та провести симптоматичну терапію.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату. Спастичний коліт, кишкова непрохідність, біль у животі нез'ясованого генезу, защемлена грижа, гострі запальні захворювання черевної порожнини, перитоніт, шлунково-кишкові і маткові кровотечі, цистит, порушення водно-електролітного обміну. Вагітність і годування груддю. Дитячий вік до 18 років.

Передозування. Можливі болі в животі, що супроводжуються коліками.

Особливості застосування. Не рекомендується приймати препарат більше 2 тижнів.

З обережністю застосовують при захворюваннях печінки та/або нирок. У період лікування сеча може набувати жовто-коричневого або червоно-бузкового кольору.

Вагітність і годування груддю. При вагітності протипоказаний. У період застосування препарату слід припинити годування груддю.

Вплив на здатність керувати автомобілем або працювати зі складними механізмами. Не впливає.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. При тривалому застосуванні Сеналексу у високих дозах можливе посилення дії серцевих глікозидів і вплив на дію антиаритмічних препаратів у зв'язку з можливістю розвитку гіпокаліємії. Одночасний прийом Сеналексу з іншими лікарськими засобами може зменшити всмоктування та ефективність останніх.

Умови та термін зберігання. Зберігати у недоступному для дітей, сухому місці при температурі не вище 25°C.

Термін придатності – 3 роки.

Не рекомендується використовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці!

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. Блістер по 20 таблеток у картонній коробці №20, 25 блістерів у картонній коробці №20x25.

Виробник. Наброс Фарма Pvt. Лтд.

Адреса. Нешіонал Хайвей, №8, Каджіпура, Кеда, Індія