

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

УРОХОЛ

(Urochol)

Склад лікарського засобу. 1мл препарату містить

діючі речовини: водно-спиртовий екстракт (1:1) із суміші: моркви дикої плодів 0,2 г, ортосифону тичинкового листя 0,18 г, споришу трави 0,15 г, кукурудзи товпчиків з приймочками 0,12 г, бузини чорної квітів 0,1 г, хвоща польового трави 0,1 г, хмелю суплідь 0,05 г, берези бруньок 0,05 г, звіробою трави 0,04 г, м'яти перцевої листя 0,01 г;

допоміжна речовина: етанол 40 %.

Лікарська форма. Краплі оральні.

Рідина темно-коричневого кольору з специфічним ароматним запахом;

при зберіганні допускається утворення осаду.

Назва і місцезнаходження виробника. ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика".

Україна, 10014, м. Житомир, вул. Лермонтовська, 5.

Фармакотерапевтична група. Спазмолітики, що діють на сечовивідні шляхи.

Код АТС G04B D20**.

Фармакологічні властивості. Комбінований препарат рослинного походження. Складові ефірних олій, що входять до складу УРОХОЛУ, послаблюють запальні процеси, сприяють посиленню кровопостачання нирок та печінки, чинять діуретичну, жовчоінну, бактерицидну дію, нормалізують тонус гладкої мускулатури верхніх сечовивідних шляхів і жовчного міхура. Легко всмоктуючись у кров та стимулюючи нирковий та печінковий кровообіг, ефірні олії спричиняють більшення сечо- та жовчовиділення. УРОХОЛ посилює діурез, чинить антиазотемічний ефект, виводить із організму сечовину, сечову кислоту, хлориди, покращує печінковий кровотік, сприяє виведенню піску та каменів з нирок, сечового та жовчного міхурів.

Показання для застосування.

Гострі та хронічні захворювання сечового міхура і нирок (цистит, пієлоцистит, уретрит, нефроз, нефрит, пієлонефрит, сольові діатези), сечокам'яна, уроковокам'яна та жовчнокам'яна хвороба, гострі та підгострі калькульозні пієлонефрити і холецистити, дискінезія жовчовивідних шляхів (у складі комплексної терапії).

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату, обтураційна жовтяниця. Дитячий вік до 12 років, вагітність, період годування груддю.

Особливі застереження.

Під час лікування слід утримуватися від ультрафіолетового опромінення. З обережністю застосовувати при станах, що супроводжуються гіперкоагуляцією. Не застосовувати, якщо діаметр каменів перевищує 3 мм.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

УРОХОЛ не застосовують у період вагітності та годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Під час лікування УРОХОЛОМ слід утримуватися від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Діти.

УРОХОЛ не застосовують дітям віком до 12 років у зв'язку з вмістом етанолу.

Спосіб застосування та дози.

Дорослі та діти віком від 12 років приймають перед їжею по 10-20 крапель, розводячи невеликою кількістю води, тричі на добу. Курс лікування залежить від тяжкості перебігу захворювання, а також від характеру супутньої терапії і триває від 5 днів до 1 місяця. За необхідності курс терапії можна повторити.

Передозування.

Симптоми: нудота, запаморочення, диспептичні явища.

Лікування: при передозуванні необхідно призначити велику кількість теплої рідини. Лікування симптоматичне.

Побічні ефекти.

Алергічні реакції, запаморочення, диспептичні явища: нудота, блювання.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не описана.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С та недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 мл або 40 мл у флаконі в паці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.