

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ПЕРМЕТРИНОВА МАЗЬ
(PERMETHRIN OINTMENT)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: перметрин;

1 г мазі містить 40 мг перметрину;

допоміжні речовини: етанол 96 % (спирт етиловий ректифікований із харчової сировини 96 %), карбомер, макрогол 400, мило туалетне, вода очищена.

Лікарська форма. Мазь.

Мазь білого або жовтувато-білого кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «Фармтехнологія». 220024, м. Мінськ, вул. Корженевського, 22.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що діють на ектеропаразитів, включаючи коростяних кліщів. Код АТС P03A C04.

Фармакологічні властивості.

Перметрин є сумішшю цис- і трансізомерів синтетичного пиретроїду. Це інсектицидний та акарицидний засіб для зовнішнього застосування, що діє на багатьох комах, у тому числі і на коростяного кліща. Пригнічує розвиток і спричиняє загибель личинок та статевозрілих особин. Протипаразитарна дія зумовлена порушенням іонної проникності через натрієві канали, гальмуванням процесів поляризації (реполяризації) мембрани нервової клітини комах, що призводить до паралізуючого ефекту. Перметрин малотоксичний для людини і теплокровних тварин.

Після нашкірної аплікації абсорбція становить не більше 2 %. Частина речовини, яка потрапила до системного кровотоку, швидко гідролізується до неактивних метаболітів, екскретується переважно з сечею. Як протикоростяний засіб ефективний після одноразової процедури.

Показання для застосування . Короста.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до активної речовини або будь-якої допоміжної речовини; вагітність, годування груддю (на період лікування припиняють), дитячий вік до 3 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Необхідно уникати попадання мазі на слизові оболонки очей, носа, ротової порожнини, сечостатевих шляхів. Якщо це трапилось, слизові оболонки слід промити великою кількістю проточної води. Після процедури ретельно вимити руки з милом.

Процедуру слід проводити в добре провітрюваному приміщенні або на вулиці.

Особливі застереження. Для уникнення повторного зараження коростою необхідно обробити (термічно) одяг, головні убори, постільну білизну.

За наявності шкірних захворювань, а також при застосуванні інших ліків слід проконсультуватись у лікаря.

Для лікування дітей препарат застосовують лише за призначенням лікаря.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Немає повідомлень про вплив препарату на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози. Невелику кількість мазі тонким шаром наносять на уражені коростою ділянки шкіри і масуючими рухами ретельно втирають у шкіру. Через 24 години після процедури мазь необхідно змити водою з милом і змінити одяг. Як правило, процедуру проводять одноразово, але якщо свербіж не припиняється чи з'являються нові елементи корости (ознака недостатньої ефективності), через 14 днів (не раніше) обробку слід повторити.

Дітям старше 3 років час експозиції становить 12 годин. Інтервал між повторною експозицією - 1-2 дні.

Мазь можна застосовувати повторно до 5 разів.

При свербіжі, який не зникає протягом 4 тижнів після лікування корости, хворому необхідно проконсультуватися у лікаря.

Передозування. Інформації про випадки передозування немає.

Побічні ефекти. В окремих випадках можлива подразнювальна дія на шкіру (відчуття печіння, поколювання або пощипування, посилення свербіжу, набряклість, оніміння шкіри, еритема), алергічні реакції (шкірні висипи, набряк).

У таких випадках застосування мазі припиняють.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші форми взаємодії.

Не встановлено.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці!

Умови зберігання. Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі від 15 ° до 25 ° С.

Упаковка. По 30 г, 50 г, 90 г у тубах у пачці з картону.

Категорія відпуску. Без рецепта.