

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

ГРАММИДИН® НЕО

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: граміцидин С гідрохлорид, цетилпіридинію хлориду моногідрат;

1 таблетка містить граміцидину С гідрохлориду у перерахуванні на граміцидин С 3 мг, цетилпіридинію хлориду моногідрату у перерахуванні на цетилпіридинію хлорид 1 мг;

допоміжні речовини: кремнію діоксид колоїдний безводний, тальк, калію ацесульфам, ароматизатор м'ятний, сорбіт (Е 420), магнію стеарат.

Лікарська форма . Таблетки длясмоктання.

Таблетки білого кольору, округлі, двоопуклі, з надписом з одного боку «GR».

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ « Валента Фармацевтика», Російська Федерація.

141101, Московська область, м. Щолково, вул. Фабрична, 2.

Тел +7 (495)933-48-62, факс +7 (495) 933-48-63.

Фармакотерапевтична група. Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла Антибіотики. Код АТС R02A B.

Граммидин® нео - комбінований препарат для лікування інфекційно-запальних захворювань горла й порожнини рота. До складу препарату входить протимікробний засіб граміцидин С та антисептичний засіб цетилпіридинію хлорид.

Механізм дії граміцидину С пов'язаний з підвищенням проникності цитоплазматичної мембрани мікробної клітини, що порушує її стійкість і викликає загибель клітини.

Цетилпіридинію хлорид належить до антисептичних засобів. Пригнічує ріст і розмноження збудників інфекційних захворювань порожнини рота.

Препарат зменшує запалення, чинить протимікробну дію, пом'якшує неприсмні відчуття в горлі, полегшує ковтання, при розсмоктуванні викликає слиновиділення, що сприяє механічному очищенню порожнини рота й глотки від мікроорганізмів.

Препарат чинить місцеву дію й практично не всмоктується в шлунково-кишковому тракті, що вказує на майже повну відсутність системних ефектів.

Показання для застосування. Інфекційно-запальні захворювання порожнини рота й горла: ангіна, фарингіт, тонзиліт, пародонтоз, гінгівіт, стоматит.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів, що входять до складу препарату.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю . Препарат не призначений для застосування І триместрі вагітності. Під час годування груддю необхідно припинити застосування препарату.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Препаратпризначений для застосування дітям віком від 12 років.

Спосіб застосування та дози. Застосовують після прийому їжі. Розсмоктують у роті, не розжовуючи. Безпосередньо після застосування препарату слід утриматися від вживання їжі і напоїв протягом 1-2 годин. Дозування для дорослих і дітей віком від 12 років: по 1 таблетці 3-4 рази на добу. За відсутності терапевтичного ефекту протягом 7 днів прийому препарату рекомендується звернутися до лікаря.

Передозування. Посилення проявів побічних реакцій. Лікування: симптоматичне.

Побічні ефекти. В окремих випадках можливі алергічні реакції на компоненти препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Граммидин® нео посилює ефекти інших протимікробних засобів місцевої і системної дії.

Термін придатності. 2 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці, в недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25⁰С.

Упаковка.

По 9 таблеток у блістері. По 2 блістери в пачці з картону.

Категорія відпуску. Без рецепта.