

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЛЕПТАНДРАКОМПОЗИТУМ
(LEPTANDRA COMPOSITUM)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини : 100 г препарату містять: Veronica virginicaD2 – 1 г, Picrasma excelsa, Quassia amara D3 – 1 г, PodophyllumpeltatumD3 – 1 г, AcidumarsenicumD4 – 1 г, Carbo vegetabilisD10 – 1 г, NiccolummetallicumD10 – 1 г, Phosphorus D6 – 1 г;

допоміжні речовини: етанол 96 %, вода очищена.

Препарат містить 35 % об. етанолу 96 %.

1 мл препарату містить 21 краплю.

Лікарська форма. Краплі оральні.

Прозорий розчин від безбарвного до світло-жовтого кольору із запахом етанолу.

Назва і місцезнаходження виробника.

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ.

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина.

Фармакотерапевтична група . Комплексний гомеопатичний препарат.

Показання для застосування. Нормалізуючий вплив на функціональний стан органів травлення.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату. Період вагітності та годування груддю.

Особливі застереження.

Застосування в період вагітності або годування груддю. Не застосовують.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Препарат містить етанол, що слід враховувати при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Діти. Препарат застосовують для лікування дітей віком від 12 років.

Спосіб застосування та дози. Застосовують дорослим і дітям віком від 12 років по 10 крапель 3 рази на добу за 15-20 хвилин до їди або через годину після їди. Краплі розчинити у 10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті (можна не розчиняти, а одразу капати під язик).

При гострих розладах, спочатку приймають разову дозу кожні 30 хвилин – 1 годину, до 12 разів на добу, далі переходять на прийом 3 рази на добу.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування. Не відзначалось.

Побічні ефекти. Небажані впливи не відомі, але слід враховувати можливість появи алергічних реакцій, що потребує відміни препарату та консультації у лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не відома.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С.

Захищати від нагрівання. Закривати флакон негайно після застосування препарату. Після першого відкриття флакона препарат придатний для застосування протягом 6 місяців.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. Картонна коробка містить скляний флакон-крапельницю по 30 мл.

Категорія відпуску. Без рецепта.