

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

БРОНСПРЕЙ

Лікарський засіб:

Опис речовини: 1 мл спрею містить рідкий екстракт трави тим'яну (Thym i herba extractum fluidum) (1: 4 – 6) (екстрагент етанол 70% об./об.) 289,6 мг, рідкий екстракт шавлії (Salviae folium extractum fluidum) (1: 4 – 6) (екстрагент етанол 70% об./об.) 289,6 мг

Додатковий опис речовини: рідкий екстракт м'яти перцевої (Menthae piperitae folium extractum fluidum) (1: 4 - 6) (екстрагент етанол 70% об./об.), левоментол, сахарин натрію (Е 954), гідроксипропілцеллозола.

Фармакологічна форма. Спрей для ротової порожнини.

Прозора рідина з характерним запахом (м'яти перцевої).

Місце виробника.

Фарма ГмбХ/ Kwizda Pharma GmbH
Eiffingergasse 21, 1160 Відень, Австрія / Eiffingergasse 21, 1160 Vienna, Austria.

Терапевтична група.

Спрей для місцевого застосування в стоматології . Код АТС А01А D11.

Ефірні масла, що містяться в активних інгредієнтах, виявляють антисептичний та злегка болезаспокійливий ефект.

Ефірні речовини, що містяться в активних інгредієнтах, виявляють в'язучий, протизапальний ефект на уражених ділянках.

Індикації для застосування.

Симптоматичне лікування запальних захворювань ротової порожнини або ротоглотки , таких як біль у горлі, захриплість і утруднене ковтання при ГРВІ.

Протипоказання.

Висока чутливість до компонентів препарату або інших рослин родини Губоцвітних (Lamiaceae), а також чутливі до селери та пилюк берези (можлива перехресна реакція).

Обмежені застереження.

Під час лікування препаратом погіршується симптоматика та/або з'являються задишка, підвищення температури тіла, гнійне мокротиння, необхідно проконсультуватися з лікарем. Якщо протягом одного тижня симптоматика зберігається, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Не рекомендується вживати алкоголь , через 60 % вміст спирту.

С.

полум 'я.

З обережністю застосовувати хворим, схильним до алергічних реакцій, та хворим на бронхіальну астму.

Застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Через відсутність достатніх даних не рекомендується застосовувати препарат у ці періоди.

Вплив на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Препарат містить етанол, що потрібно враховувати при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

и. Не застосовують.

Спосіб застосування та дози.

Виплювати 1-2 рази кожні 1,5-3 години в роті (не більше 10 розпилень на добу).

Відхилити головку насадку-розпилювач під прямим кутом до флакона (див. рисунок).

Направити головку насадки-розпилювача на бажане місце застосування у ротовій порожнині. Насадка забезпечує можливість розпилювання навіть на важкодоступні ділянки (наприклад, зубні мішечки).

Виплювати на болючі ділянки, натискаючи на насадку 1-2 рази.

Відхилити насадку-розпилювач після кожного застосування шляхом повернення її в початкове положення (див. рисунок).

Якщо стан хворого не покращився або навіть погіршився після лікування препаратом протягом 5 днів, слід звернутися до лікаря.

Після застосування препарату рекомендується протягом 30 хв. утримуватися від приймання їжі і пиття.

Передозування.

Симптоми передозування є підвищення температури тіла, тахікардія, запаморочення і судоми епілептичного характеру, що проявляються при прийомі кількості препарату, що перевищує в перерахунку 15 г листя шавлії.

Побічні реакції.

Через вміст спирту в окремих випадках можливе тимчасове печіння у місцях запалення. Можливий розвиток алергічних реакцій (гіперемія, висипання, свербіж та набрякання шкіри). При прийомі лікарських засобів, що містять тим'яну, спостерігались реакції підвищеної чутливості (включаючи один випадок анафілактичного шоку та набряк Квінке). Можливі шлунково-кишкові розлади (включаючи нудоту, блювання, діарею).

Потенціал виникнення побічних ефектів невідомо.

У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити лікування та звернутися до лікаря.

Сумісність з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Дослідження не проводилися.

Сумісність з іншими лікарськими засобами, що містять листя шавлії, можуть вплинути на ефект лікарських засобів, таких як барбітурати, бензодіазепіни, що діють через ГАМК рецептори. У зв'язку з цим одночасний прийом не рекомендується.

Термін придатності. 3 роки.

Зберігати з першого відкриття зберігати 8 тижнів.

Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 15 мл спрею для ротової порожнини у флаконі з дозуючим насосом та складною насадкою-розпилювачем. По 1 флакону з інструкцією для медичного застосування у коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.