

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
МЕЛІЛОТУС-ГОМАКОРД Н
(MELILOTUS-HOMACCORD[®] N)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 100 г препарату містять: Melilotus officinalis D1 – 0,2 г, Melilotus officinalis D4 – 0,2 г, Melilotus officinalis D10 – 0,2 г, Melilotus officinalis D30 – 0,2 г, Melilotus officinalis D200 – 0,2 г, Crataegus Ø – 60,0 г, Crataegus D10 – 0,8 г, Crataegus D30 – 0,8 г, Crataegus D200 – 0,8 г;

допоміжні речовини: етанол 96 %, вода очищена.

Препарат містить 45 % об. етанолу 96 %.

1 мл препарату містить 21 краплю.

Лікарська форма. Краплі оральні.

Прозорий розчин темно-каштанового кольору із запахом етанолу. Іноді після зберігання можливе утворення пластівчастого осаду.

Назва і місцезнаходження виробника.

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ.

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості для гомеопатичних препаратів не визначаються.

Показання для застосування. Нейроциркуляторна дистонія з артеріальною гіпертензією, порушення кровообігу.

Противпоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату Вагітність. Період годування груддю. Дитячий вік.

Особливі застереження.

Застосування в період вагітності або годування груддю. Не застосовують через відсутність відомостей про застосування вагітними та жінками, які годують груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не слід застосовувати препарат при керуванні транспортними засобами або при роботі з іншими механізмами.

Діти. Через недостатність належного задокументованого досвіду застосування препарату у дітей, даний лікарський засіб не рекомендовано застосовувати у цій віковій категорії.

Спосіб застосування та дози. Разова доза: дорослим – 10 крапель 3 рази на добу за 15 – 20 хв до вживання їжі або через годину після. Краплі розчинити у 10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті (можна не розчиняти, а одразу крапати під язик).

При гострих розладах спочатку слід приймати разову дозу кожні 15 хв (протягом періоду до 2 годин), далі - перейти на прийом 3 рази на добу.

Максимальна добова доза (за винятком початкового періоду гострих розладів) – 30 крапель.

Тривале застосування препарату (протягом кількох місяців і довше) – під наглядом лікаря.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування. Не відзначалось.

Побічні ефекти. Підвищена чутливість до компонентів препарату диспептичні явища.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Препарат може посилювати седативну дію при застосуванні з седативними, нейротропними засобами, транквілізаторами.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C.

Захищати від нагрівання. Закривати флакон негайно після застосування препарату.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. Картонна коробка містить скляний флакон-крапельницю по 30 мл.

Категорія відпуску. Без рецепта.