

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату

ШЛУНКОВИЙ СІК НАТУРАЛЬНИЙ
(GASTRIC JUICE NATURAL)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 флакон містить шлункового соку натурального 99,45 мл;

допоміжна речовина: розчин саліцилової кислоти спиртовий.

Лікарська форма. Рідина оральна.

Прозора, безбарвна або злегка опалесціюча жовтуватого кольору рідина з ледь кислуватим запахом та гіркувато-кислим смаком.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ «БІОФАРМА».

Україна, 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 9.

Фармакотерапевтична група. Препарати пепсину та кислоти.

Код АТС А09А С01.

Застосування препарату нормалізує рівень кислотності у шлунку та процеси травлення, усуває диспептичні симптоми, сприяє відновленню апетиту.

Показання для застосування. Гіпоацидний та анацидний гастрити, ахілія.

Протипоказання. Підвищена кислотність шлункового соку, гастроєзофагеальний рефлюкс; пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки; ерозії шлунка та дванадцятипалої кишки; підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні. При зберіганні у теплому місці швидко втрачає активність. При потраплянні в очі – промити уражене око великою кількістю води, накласти асептичну пов'язку та звернутися по допомогу до лікаря-офтальмолога.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Не вивчалось.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Застережень немає.

Діти. Застосовувати дітям віком від 1 року за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози. Застосовувати перорально під час або після прийому їжі. Дорослим та дітям віком від 14 років – по 1-2 столові ложки; дітям віком від 1 до 3 років – по 1 чайній ложці; дітям віком від 3 до 6 років – по 1 десертній ложці; дітям віком від 7 до 14 років – по 1 десертній або 1 столовій ложці 2-3 рази на день.

Тривалість застосування лікарського засобу встановлює лікар в індивідуальному порядку.

Передозування. Випадки передозування не описані. Можливе посилення проявів побічних реакцій.

Лікування: симптоматичне; промивання шлунка, антацидні засоби.

Побічні ефекти. У рідкісних випадках: гастралгія, печія, блювання. Можливі виникнення реакцій гіперчутливості.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не вивчались.

Термін придатності. 1 рік.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 2 °С до 8 °С. При появі пластівців та втраті прозорості препарат є непридатним для використання.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 100 мл у флаконі. По 1 флакону у картонній пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.