

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**АРТРОН® ФЛЕКС**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* 1 таблетка містить глюкозаміну гідрохлориду 750 мг;

*допоміжні речовини:* кальцію карбонат, целюлоза мікрокристалічна, кислота стеаринова, кремнію діоксид колоїдний безводний, натрію кроскармелоза, магнію стеарат, гіпромелоза (гідроксипропілметилцелюлоза), титану діоксид (Е 171), поліетиленгліколь (макрогол) 400, барвник заліза оксид жовтий (Е 172), полісорбат 80.

**Лікарська форма.** Таблетки, вкриті оболонкою.

Овальні таблетки з двоопуклою поверхнею, вкриті оболонкою від світло-бежевого до бежевого кольору, з вибитим написом «GL 750» з одного боку таблетки.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

Юніфарм, Інк., 200 Хікс стріт, Вестбері, Нью-Йорк, 11590, США.

Юніфарм, Інк., 75 Прогрес Лейн, Вотербері, Коннектикут, 06705, США.

**Фармакотерапевтична група.** Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. Глюкозамін. Код АТС М01А Х05.

Препарат стимулює регенерацію хрящової тканини, чинить протизапальну та знеболювальну дію. Хондропротекторні властивості препарату зумовлює його активний чинник – глюкозамін.

Глюкозамін стимулює біосинтез аміногліканів, сприяє відновленню хрящових поверхонь та зменшенню дегенеративних змін у суглобах. Нормалізує продукування внутрішньосуглобної рідини, послаблює біль у суглобах, покращує їх рухливість.

**Показання для застосування.** Дегенеративно-дистрофічні захворювання периферичних суглобів і хребта (остеоартрит, тендиніт, остеохондроз); остеопаїї та хондропатії, хондромаліяція, пародонтопатії; профілактика та лікування ушкоджень суглобів унаслідок фізичних перевантажень (у тому числі спортивної травми); період реконвалесценції після переломів кісток (для прискорення утворення кісткового мозоля), травм, операцій опорно-рухового апарату.

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату, тромбоз, цукровий діабет, порушення функції печінки або нирок у стадії декомпенсації, фенілкетонурія, схильність до кровотеч.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.** Не перевищувати рекомендовану дозу.

Через те, що глюкозамін отримують з панцира моллюсків, пацієнти, які страждають на алергію на моллюсків, повинні приймати даний препарат з обережністю.

**Особливі застереження.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.** Препарат протипоказаний у період вагітності. На період лікування препаратом слід припинити годування груддю.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.** Не впливає.

**Діти.** Препарат не застосовувати дітям.

**Спосіб застосування та дози.** Препарат призначати дорослим.

Приймати внутрішньо по 1-2 таблетки на день, запивати водою. Мінімальна тривалість курсу терапії – 6 тижнів; клінічний ефект спостерігається через 2-3 місяці застосування препарату. Клінічний ефект настає повільно і зберігається тривалий час після припинення прийому. Рекомендується розпочинати лікування з 2 таблеток на день (вранці та ввечері), потім переходити на 1 таблетку на день.

**Передозування.** При передозуванні можливе посилення побічних ефектів. При випадковому гострому передозуванні необхідно викликати блювання. Подальше лікування симптоматичне.

**Побічні ефекти.**

*З боку імунної системи:* алергічні реакції, включаючи шкірні висипання, кропив'янку, відчуття свербіжжю, еритему, дерматит, макулопапульозні висипання, ангіоневротичний набряк.

*З боку травного тракту:* диспептичні розлади, нудота, блювання, біль у животі, запор, діарея, метеоризм.

*З боку нервової системи:* запаморочення, сонливість, головний біль, безсоння, підвищена втомлюваність.

*Інші:* випадання волосся, розлади зору, загальна слабкість, набряки.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** При одночасному прийомі глюкозамін посилює всмоктування в травному тракті антибіотиків групи тетрациклінів і зменшує – пеніцилінів і хлорамфеніколу. Виявляє синергізм дії при одночасному застосуванні з хондроїтином та іншими хондропротекторами. При одночасному застосуванні з глюкокортикостероїдами та нестероїдними протизапальними засобами препарат може знижувати потребу в них, а також у знеболювальних засобах. Ефективність лікування підвищується при збагаченні дієти вітамінами А, С та солями марганцю, магнію, міді, цинку і селену.

Було відмічено посилення дії кумаринових антикоагулянтів. У зв'язку з цим у цих пацієнтів доцільно проводити контроль параметрів коагуляції.

**Термін придатності.** 3 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С.

**Упаковка.**

По 15 таблеток у блістері; по 1 блістеру у коробці. По 30 або 60, або 120 таблеток у флаконі; по 1 флакону у коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.