

ІНСТРУКЦІЯ

про застосування медичного імунобіологічного препарату

Фермалак®

Бактеріальний препарат для відновлення та підтримання нормальної вагінальної мікрофлори

Загальна характеристика

Основні фізико-хімічні властивості: непрозорі желатинові капсули білого кольору, які містять дрібний порошок білого кольору з маленькими бежевими вкрапленнями.

Якісний та кількісний склад

Діючі речовини: кожна капсула містить не менше 2×10^9 мільярди ліофілізованих бактерій *Lactobacillus rhamnosus* R0011 ($1,6 \times 10^9$), йогуртова культура: *Streptococcus thermophilus* ($0,2 \times 10^9$) та *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *Vulgaricus* ($0,2 \times 10^9$).

Допоміжні речовини: лактоза, стеарат магнію, аскорбінова кислота.

Форма випуску. Капсули вагінальні.

Код АТС. А07FA01.

Імунологічні та біологічні властивості

Фермалак® являє собою вагінальні капсули, що містять молочнокислі бактерії, які входять до складу нормальної мікрофлори кишківника та вагіни. Вони здатні виробляти молочну кислоту, підтримувати кислотний баланс у вагіні та запобігати розмноженню патогенних мікробів, які можуть призвести до гнійно-запальних процесів.

Показання для застосування

Фермалак® - використовується для профілактики і лікування вагінальних інфекцій та для відновлення і підтримання нормальної вагінальної мікрофлори у наступних випадках:

- у складі комплексної терапії лікування вагінальних запалень, викликаних патогенними бактеріями (в тому числі *Trichomonas vaginalis*) та іншими збудниками;
- у складі комплексної терапії вульво-вагінального кандидозу для підвищення ефективності лікування;

- після застосування різноманітних антибіотиків, контрацептивів, а також при проведенні хіміотерапії;
- до або після гінекологічного місцевого лікування;
- як профілактичний захід при використанні тампонів, місцевих контрацептивів, при недостатній гігієні.

У всіх перерахованих вище випадках, пацієнтка може застосовувати препарат без призначення лікаря. Проте, при лікуванні запальних процесів, що вже існували раніше, необхідно проконсультуватись з лікарем, якщо це захворювання не минає протягом одного тижня.

Спосіб застосування та дози

Фермалак® слід приймати за рекомендацією лікаря, або наступним чином:

1. З метою профілактики: помістіть глибоко-вагінально 1 капсулу 2 рази на тиждень увечері, перед сном. Можливе застосування у поєднанні з контрацептивами.
2. При лікуванні вагінальних інфекцій: помістіть 1 капсулу глибоко-вагінально раз на день увечері перед сном, застосовувати протягом 10 днів.
3. В комплексному лікуванні вульво-вагінального кандидозу на заключному етапі лікування: помістіть 1 капсулу глибоко-вагінально раз на день увечері перед сном, застосовувати протягом 10 днів.

У випадку виникнення загострення вульво-вагінального кандидозу після застосування Фермалаку, необхідно провести повторну антимікотичну терапію і потім застосувати решту капсул: помістіть 1 капсулу глибоко-вагінально 1 раз на день увечері перед сном.

4. Для профілактики перед або після гінекологічного втручання: помістіть 1 капсулу глибоко-вагінально 1 раз на день увечері перед сном, застосовувати протягом 10 днів (розпочати застосування необхідно до початку лікування).

Техніка введення капсули

При кожному застосуванні слід капсулу вводити глибоко-вагінально за допомогою аплікатора, що додається. Після кожного використання, обережно витягніть поршень з аплікатора та ретельно вимийте обидві частини у кип'яченій теплій воді. Після висихання аплікатор готовий до наступного використання.

Застереження

Під час лікування, не застосовуйте вагінальні спринцювання з антисептиками, так як вони впливають на життєздатність живих бактерій, що містяться в препараті. У випадку не діагностованої або недолікованої кандидозної інфекції можливе її загострення на фоні застосування Фермалаку®. Тоді необхідно провести повторну антимікотичну терапію і після цього продовжити лікування препаратом.

Побічні ефекти

У поодиноких випадках може спостерігатися алергічна реакція (яка виражається у місцевому свербінні у вагіні). Прояви інших побічних ефектів невідомо. У разі виникнення будь-якого небажаного ефекту або анормальної реакції, зверніться до лікаря.

Протипоказання

Фермалак® не можна застосовувати при алергії до будь-якого зінгредієнтів препарату. Інших протипоказань немає.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

На теперішній час немає відомостей про взаємодію препарату Фермалак® з іншими лікарськими засобами. Проте, ви маєте повідомити свого лікаря, про всі препарати, які Ви приймаєте за рецептом, або без нього. Якщо лікар виписує або рекомендує препарати на майбутнє, інформуйте його, що Ви застосовуєте Фермалак®.

Умови зберігання

Препарат зберігають в холодильнику при температурі від 2 до 8 °С. Відкритий флакон берегти від вологи. Тримайте подалі від дітей.

Термін придатності

2 роки.

Умови відпуску

Без рецепта.

Пакування

10 капсул у пластиковому флаконі в картонній коробці в комплекті з аплікатором.

Виробник

Institut Rosell Inc., Canada / Інститут Розель Інк., Канада
Адреса: 8480, boul. St-Laurent, Montreal, Quebec, Canada, H2P 2M6 / 8480 бульвар Св. Лаврентія, Монреаль, Квебек, Канада, H2P 2M6