

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ГІДРОПЕРИТ

Склад лікарського засобу:

діюча речовина:

1 таблетка містить гідропериту 1,5 г.

Лікарська форма. Таблетки для приготування розчину для зовнішнього застосування.

Таблетки білого кольору із малопомітними вкрапленнями прозорих кристалів, плоскоциліндричної форми, з фаскою.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод».

Україна, 91019, м. Луганськ, вул. Кірова, 17.

Фармакотерапевтична група.

Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Код АТС D08A X01.

При контакті розчину перекису водню з ушкодженою шкірою та слизовими оболонками вивільняється активний кисень, який сприяє очищенню ранової поверхні та інактивації органічних речовин (протеїн, кров, гній). При застосуванні препарату відбувається лише тимчасове зменшення кількості мікроорганізмів. Препарат має кровоспинний ефект.

Показання для застосування.

Препарат застосовують для зупинки капілярної кровотечі при поверхневому ушкодженні тканин, носових кровотечах, для обробки слизової оболонки при стоматитах, пародонтитах, ангінах, гінекологічних захворюваннях, а також при гнійних ранах.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Застосування розчину на пов'язку забезпечує безболісне зняття її з рани. Велика кількість піни, що утворюється, сприяє механічному очищенню рани від гною і тканинного детриту. Препарат слід з обережністю застосовувати для обробки глибоких ран та зрошення порожнин, враховуючи можливість емболій.

Препарат нестабільний у лужному середовищі, у присутності металів, складних радикалів деяких оксидантів, а також в освітленому і теплому місці. Слід уникати потрапляння розчину в очі.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосовують.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Застосовують.

Спосіб застосування та дози.

Для промивання ран 2 таблетки Гідропериту розчиняють у 100 мл кип'яченої води, що відповідає приблизно 1 % розчину перекису водню.

Для полоскань 1 таблетку розчиняють у склянці кип'яченої води (200 мл), що відповідає 0,25 % розчину перекису водню. Розчин застосовують свіжоприготовленим.

Для обробки ранових поверхонь, аплікацій, зупинки кровотечі (капілярної) уражені ділянки обробляють тампоном, просоченим розчином перекису водню.

Тривалість лікування залежить від досягнутого ефекту.

Передозування.

При потраплянні на шкіру високих концентрацій перекису водню (20-40 % розчин, у разі помилки при приготуванні розчину) – побіління шкіри, опік, який супроводжується виникненням пухирів. Місце опіку необхідно промити холодною водою.

При прийомі внутрішньо – опік слизової оболонки травного тракту. Лікування симптоматичне.

Побічні ефекти.

Можливе відчуття печіння в момент обробки рани. У деяких випадках при індивідуальній чутливості до компонентів препарату можливе виникнення місцевих алергічних реакцій. При тривалому застосуванні для обробки слизової оболонки рота можлива гіпертрофія сосочків язика.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Взаємодія поки що невідома.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у захищеному від світла та вологі місці при температурі не вище 20 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 6 таблеток у блістері або стрипі; по 8 таблеток у блістері.

Категорія відпуску.

Без рецепта.