

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**

**ЦЕФТАДИМ**

**Склад:**

діюча речовина: цефтазидим;

1 флакон містить цефтазидиму пентагідрату у перерахуванні на цефтазидим 1 г;

допоміжна речовина: натрію карбонат.

**Лікарська форма.** Порошок для розчину для ін'єкцій.

**Основні фізико-хімічні властивості:** кристалічний порошок від білого до кремового кольору.

**Фармакотерапевтична група.**

Антибактеріальний засіб для системного застосування. Цефалоспорини.

Код ATX J01D D02.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.**

Цефтазидим – це бактерицидний цефалоспориновий антибіотик, механізм дії якого пов’язаний з порушенням синтезу стінок бактеріальної клітини.

Набута резистентність до антибіотика відрізняється у різних регіонах та може змінюватися з часом, а для окремих штамів може відрізнятися суттєво. Бажано використовувати місцеві (локальні) дані щодо чутливості до антибіотика, особливо при лікуванні тяжких інфекцій.

**Чутливі мікроорганізми**

Грампозитивні аероби: *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus agalactiae*.

Грамнегативні аероби: *Citrobacter koseri*, *Escherichia coli*, *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catarrhalis*, *Neisseria meningitidis*, *Proteus mirabilis*, *Proteus spp.*, *Providencia spp.*

**Штами з можливою набутою резистентністю**

Грамнегативні аероби: *Acinetobacter baumannii*, *Burkholderia cepacia*, *Citrobacter freundii*, *Enterobacter aerogenes*, *Enterobacter cloacae*, *Klebsiella pneumoniae*, *Klebsiella spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Serratia spp.*, *Morganella morgani*.

Грампозитивні аероби: *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus pneumoniae*.

Грампозитивні анаероби: *Clostridium perfringens*, *Peptococcus spp.*, *Peptostreptococcus spp.*,

Грамнегативні анаероби: *Fusobacterium spp.*.

**Нечутливі мікроорганізми**

Грампозитивні аероби: *Enterococcus spp.*, включаючи *E. faecalis* та *E. faecium*, *Listeria spp.*.

Грампозитивні анаероби: *Clostridium difficile*

Грамнегативні анаероби: *Bacteroides spp.*, включаючи *B. fragilis*

Інші: *Chlamydia spp.*, *Mycoplasma spp.*, *Legionella spp.*

**Фармакокінетика.**

У пацієнтів після внутрішньом’язової ін’єкції 1 г препарату швидко досягаються середні пікові концентрації 18 і 37 мг/л відповідно. Через 5 хв після внутрішньовенного болісного введення 1 г або 2 г у сироватці крові досягаються концентрації у середньому 46, 87 або 170 мг/л відповідно. Терапевтично ефективні концентрації залишаються у сироватці крові навіть через 8-12 годин після внутрішньовенного та внутрішньом’язового введення. Зв’язування з білками плазми крові становить приблизно 10 %.

Концентрація цефтазидиму, що перевищує МІК для більшості розповсюджених патогенних мікроорганізмів, досягається у таких тканинах і середовищах як кістки, серце, жовч, мокротиння, внутрішньоочна, синовіальна, плевральна та перитонеальна рідини. Цефтазидим швидко проникає крізь плаценту та у грудне молоко. Препарат погано проникає крізь неушкоджений гематоенцефалічний бар’єр, при відсутності запалення концентрація препарату в центральній нервовій системі (ЦНС) мала. Однак при запаленні мозкових оболонок концентрація цефтазидиму у ЦНС становить 4-20 мг/л і вище, що відповідає рівню його терапевтичної концентрації.

Цефтазидим не метаболізується в організмі. Після парентерального введення досягається висока та стійка концентрація цефтазидиму в сироватці крові. Період напіввиведення становить приблизно 2 години.

Препарат виводиться у незміненому вигляді, в активній формі із сечею шляхом гломерулярної фільтрації; приблизно 80-90 % дози виводиться із сечею протягом 24 годин. У пацієнтів із порушенням функції нирок елімінація цефтазидиму знижується, тому дозу слід зменшувати. Менше 1 % препарату виводиться з жовчю, що значно обмежує кількість препарату, яка потрапляє у кишечник.

## **Клінічні характеристики.**

### **Показання.**

Лікування наведених нижче інфекцій у дорослих та дітей, включаючи новонароджених:

- внутрішньолікарняна пневмонія;
- інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз;
- бактеріальний менінгіт;
- хронічний середній отит;
- злюкісний зовнішній отит;
- ускладнені інфекції сечовивідних шляхів;
- ускладнені інфекції шкіри та м'яких тканин;
- ускладнені інфекції черевної порожнини;
- інфекції кісток і суглобів;
- перitonіт, пов'язаний з проведеним діалізу у хворих, які знаходяться на безперервному амбулаторному перитонеальному діалазі.

Лікування бактеріемії, що виникає у пацієнтів у результаті будь-якої з наведених вище інфекцій.

Цефтадим можна застосовувати для лікування хворих із нейтропенією та гарячкою, що виникає у результаті бактеріальної інфекції.

Цефтадим можна застосовувати для профілактики інфекційних ускладнень при операціях на передміхуровій залозі (трансуретральна резекція).

При призначенні цефтазидиму слід враховувати його антибактеріальний спектр, скерований головним чином проти грамнегативних аеробів (див. розділи «Особливості застосування» та «Фармакологічні властивості»).

Цефтадим слід застосовувати з іншими антибактеріальними засобами, якщо очікується, що ряд мікроорганізмів, що спричинили інфекцію, не підпадають під спектр дії цефтазидиму.

Призначати препарат слід згідно з існуючими офіційними рекомендаціями щодо призначення антибактеріальних засобів.

### **Протипоказання.**

Підвищена чутливість до цефтазидиму або до інших компонентів препарату.

Підвищена чутливість до цефалоспоринових антибіотиків.

Наявність в анамнезі тяжкої гіперчутливості (наприклад, анафілактичні реакції) до інших бета-лактамних антибіотиків (пеніциліни, монобактами та карбапенеми).

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Одночасне застосування високих доз препарату з нефротоксичними лікарськими засобами може негативно впливати на функцію нирок (див. розділ «Особливості застосування»).

Хлорамfenікол *in vitro* є антагоністом цефтазидиму та інших цефалоспоринів. Клінічне значення цього явища невідоме, проте якщо пропонується одночасне застосування Цефтадиму з хлорамfenіколом, слід враховувати можливість антагонізму.

Як і інші антибіотики, Цефтадим може впливати на флору кишечнику, що призводить до зменшення реабсорбції естрогенів та зниження ефективності комбінованих пероральних контрацептивних засобів. Цефтазидим не впливає на результати визначення глюкозурії ензимними методами, проте невеликий вплив на результати аналізу може спостерігатися при застосуванні методів відновлення міді (Бенедикта, Фелінга, Клінітест).

Цефтазидим не впливає на лужнопікратний метод визначення креатиніну.

### **Особливості застосування.**

Як і при застосуванні інших бета-лактамних антибіотиків, повідомлялося про тяжкі та часом летальні реакції гіперчутливості. У разі виникнення тяжких реакцій гіперчутливості лікування цефтазидимом слід негайно припинити та розпочати відповідні невідкладні заходи.

Перед початком лікування слід визначити у пацієнта наявність в анамнезі тяжких реакцій гіперчутливості до цефтазидиму, цефалоспоринових антибіотиків або інших бета-лактамних антибіотиків. З обережністю препарат призначати пацієнтам, у яких були несерйозні реакції гіперчутливості на інші бета-лактамні антибіотики.

Цефтазидим має обмежений спектр антибактеріальної активності. Він не є прийнятним препаратом для монотерапії деяких типів інфекцій, якщо тільки невідомий збудник хвороби і невідомо, що він є чутливим до цього препарату або існує велика вірогідність того, що можливий збудник буде чутливим до лікування цефтазидимом. Це особливо важливо, коли вирішується питання про лікування пацієнтів із бактеріємією, бактеріальним менінгітом, інфекціями шкіри та м'яких тканин та інфекціями кісток та суглобів. Крім того, цефтазидим чутливий до гідролізу деякими бета-лактамазами з розширенням спектром дії. Тому при виборі цефтазидиму для лікування слід враховувати інформацію про розповсюдження мікроорганізмів, що продукують бета-лактамази з розширенням спектром дії.

Одночасне лікування високими дозами цефалоспоринів і нефротоксичними препаратами, такими як аміноглікозиди або сильнодіючі діуретики (наприклад, фуроsemід), може несприятливо впливати на функцію нирок. Досвід клінічного застосування цефтазидиму показав, що при дотриманні рекомендованого дозування це явище малоямовірне. Немає даних, що цефтазидим несприятливо впливає на функцію нирок у звичайних терапевтических дозах.

Цефтазидим виводиться нирками, тому дозу слід зменшувати відповідно до ступеня ураження нирок. Повідомлялося про випадки неврологічних ускладнень, коли доза не була відповідно зменшена (див. розділи «Способ застосування та дози» та «Побічні реакції»).

Як і при застосуванні інших антибіотиків широкого спектра дії, тривале лікування Цефтадимом може привести до надмірного росту нечутливих мікроорганізмів (наприклад, *Candida*, *Enterococci*); у цьому випадку може бути необхідним припинення лікування або вживання інших необхідних заходів. Дуже важливо постійно контролювати стан хворого.

При застосуванні антибіотиків повідомлялося про випадки псевдомемброзного коліту, що може бути різного ступеня тяжкості від легкого до такого, що загрожує життю. Тому важливо зважити на встановлення цього діагнозу у пацієнтів, у яких виникла діарея під час або після застосування антибіотика. У разі тривалої та значної діареї або якщо у пацієнта виникають абдомінальні спазми, лікування слід негайно припинити, провести подальше обстеження пацієнта та при необхідності призначити специфічне лікування *Clostridium difficile*. Не слід призначати лікарські засоби, що уповільнюють перистальтику кишечнику.

Як і при застосуванні інших цефалоспоринів і пеніцилінів широкого спектра дії, деякі раніше чутливі штами *Enterobacter* spp. і *Serratia* spp. можуть стати резистентними під час лікування цефтазидимом. У таких випадках слід періодично виконувати дослідження на чутливість.

Препарат містить у своєму складі натрій (флакон з 1 г цефтазидиму – 52 мг натрію), що слід враховувати при лікуванні пацієнтів, які знаходяться на натрій-контрольованій дієті.

### *Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Дані щодо лікування цефтазидимом вагітних обмежені. Дослідження на тваринах не вказують на пряний або непрямий шкідливий вплив на вагітність, ембріональний або постнатальний розвиток. Призначати препарат вагітним слід тільки тоді, коли користь від його застосування переважає можливий ризик.

Цефтазим потрапляє у грудне молоко у невеликих кількостях, але при застосуванні терапевтических доз впливу на немовля, яке знаходиться на грудному годуванні, не очікується. Цефтазидим можна застосовувати у період годування груддю.

### *Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Відповідних досліджень не проводилося. Але виникнення таких побічних реакцій як запаморочення може вплинути на здатність керувати автотранспортом або іншими механізмами (див. розділ «Побічні реакції»).

### **Способ застосування та дози.**

Дорослі та діти  $\geq 40$  кг

| Інтермітуюче введення                              |  |
|--|--|
| Інфекція   | Доза, що вводиться   |
| інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз | 100-150 мг/кг маси тіла/на добу кожні 8 годин, максимально до 9 г на добу <sup>1</sup> |

|   |   |
|---|---|
| фебрильна нейтропенія   | 2 г кожні 8 годин   |
| внутрішньолікарняна пневмонія   |   |
| бактеріальний менінгіт  | 1-2 г кожні 8 годин   |
| бактеріємія*  |   |
| інфекції кісток і суглобів  | 1-2 г кожні 8 годин або 12 годин  |
| ускладнені інфекції шкіри та м'яких тканин  |   |
| ускладнені інтраабдомінальні інфекції   | 1 г під час індукції в анестезію, 1 г у момент видалення катетера   |
| перитоніт, пов'язаний з безперервним амбулаторним перитонеальним діалізом                             |   |
| ускладнені інфекції сечовивідних шляхів   | 1-2 г кожні 8 годин   |
| профілактика інфекційних ускладнень при операціях на передміхуровій залозі (трансуретральна резекція) |   |
| хронічний середній отит   | Доза, що вводиться  |
| злоякісний зовнішній отит   |   |
| <i>Постійна інфузія</i>   |   |
| Інфекція  |   |
| фебрильна нейтропенія   | Вводиться навантажувальна доза 2 г з наступним постійним інфузійним введенням від 4 до 6 г кожні 24 години <sup>1</sup> |
| внутрішньолікарняна пневмонія   |   |
| інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз  |   |
| бактеріальний менінгіт  |   |
| бактеріємія*  |   |
| інфекції кісток і суглобів  |   |
| ускладнені інфекції шкіри та м'яких тканин  |   |
| ускладнені інтраабдомінальні інфекції   |   |
| перитоніт, пов'язаний з безперервним амбулаторним перитонеальним діалізом                             |   |

1 У дорослих пацієнтів із нормальнюю функцією нирок 9 г на добу після застосування не виникало побічних реакцій.

Діти  40 кг

| Немовлята та діти віком<br>> 2 місяців та масою тіла<br><input type="checkbox"/> 40 кг | Інфекція  | Звичайна доза  |
|--|---|--|
| <i>Інтермітуюче введення</i>   |   |  |
|  | ускладнені інфекції сечовивідних шляхів                                   | 100-150 мг/кг маси тіла/на добу у 3 прийоми, максимально 6 г на добу |
|  | хронічний середній отит   |  |
|  | злоякісний зовнішній отит   |  |
|  | нейтропенія у дітей   | 150 мг/кг маси тіла/на добу у 3 прийоми, максимально 6 г на добу     |
|  | інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз                        |  |
|  | бактеріальний менінгіт  |  |
|  | бактеріємія*  |  |
|  | інфекції кісток і суглобів  | 100-150 мг/кг маси тіла/на добу у 3 прийоми, максимально 6 г на добу |
|  | ускладнені інфекції шкіри та м'яких тканин                                |  |
|  | ускладнені інтраабдомінальні інфекції                                     |  |
|  | перитоніт, пов'язаний з безперервним амбулаторним перитонеальним діалізом |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <i>Постійна інфузія</i>   | фебрильна нейтропенія<br>внутрішньолікарняна пневмонія<br>інфекції дихальних шляхів у хворих на муковісцидоз<br>бактеріальний менінгіт<br>бактеріємія*<br>інфекції кісток і суглобів<br>ускладнені інфекції шкіри та м'яких тканин<br>ускладнені інтраабдомінальні інфекції<br>перитоніт, пов'язаний з безперервним амбулаторним перitoneальним діалізом | Вводиться навантажувальна доза 60-100 мг/кг маси тіла з наступним постійним інфузійним введенням 100-200 мг/кг маси тіла на добу, максимально до 6 г на добу |
| Немовлята та діти віком $\leq 2$ місяці   | Інфекція   | Звичайна доза  |
| <i>Інтермітуюче введення</i>  | Більшість інфекцій   | 25-60 мг/кг маси тіла/добу у 2 прийоми <sup>1</sup>  |
| 1У немовлят та дітей віком $\leq 2$ місяців період навіввиведення із сироватки крові може бути у 2-3 рази більший, ніж у дорослих |  |  |

\*якщо це асоціюється або є підозра на асоціювання з інфекціями, наведеними в розділі «Показання».

### Діти.

Безпека та ефективність застосування Цефтадиму шляхом постійної врутреншньовенної інфузії у немовлят та дітей  $\leq 2$  місяців не встановлені.

### Пацієнти літнього віку.

Враховуючи зниження кліренсу цефтазидиму, для хворих літнього віку, які мають гострі інфекції, добова доза зазвичай не повинна перевищувати 3 г, особливо у пацієнтів віком від 80 років.

### Печінкова недостатність.

Необхідності у зміні дозування для хворих із легкою та помірною печінковою недостатністю немає. Клінічних досліджень у хворих із тяжкою печінковою недостатністю не проводилося. Рекомендується ретельний клінічний нагляд за ефективністю та безпекою застосування.

### Ниркова недостатність.

Цефтазидим виводиться нирками у незміненому стані. Тому пацієнтам із порушеннями функції нирок дозу слід зменшити.

Початкова доза повинна становити 1 г. Визначення підтримуючої дози повинно базуватися на швидкості гломерулярної фільтрації.

*Рекомендовані підтримуючі дози цефтазидиму при нирковій недостатності – інтермітуюче введення.*

Дорослі та діти  $\geq 40$  кг маси тіла

| Кліренс креатиніну, мл/хв | Приблизний рівень креатиніну у сироватці крові, мкмоль/л (мг/дл) | Рекомендована одноразова доза цефтазидиму, г | Частота дозування (години) |
|---------------------------|--|--|----------------------------|
| 50-31                     | 150-200 (1,7-2,3)  | 1  | 12                         |
| 30-16                     | 200-350 (2,3-4)  | 1  | 24                         |
| 15-6                      | 350-500 (4-5,6)  | 0,5  | 24                         |

|     |                  |     |    |
|-----|------------------|-----|----|
| < 5 | > 500<br>(> 5,6) | 0,5 | 48 |
|-----|------------------|-----|----|

Пацієнтам із тяжкими інфекціями одноразову дозу можна збільшити на 50 % або відповідно збільшити частоту введення. Таким пацієнтам рекомендується контролювати рівень цефтазидиму у сироватці крові. У дітей кліренс креатиніну слід відкоригувати відповідно до площин поверхні тіла або до маси тіла.

#### Діти □ 40 кг

| Кліренс креатиніну, мл /хв** | Приблизний рівень креатиніну* у сироватці крові, мкмоль/л (мг/дл) | Рекомендована індивідуальна доза мг/кг маси тіла | Частота дозування (години) |
|------------------------------|---|--|----------------------------|
| 50-31                        | 150-200<br>(1,7-2,3)  | 25   | 12                         |
| 30-16                        | 200-350<br>(2,3-4)  | 25   | 24                         |
| 15-6                         | 350-500<br>(4-5,6)  | 12,5   | 24                         |
| < 5                          | > 500<br>(> 5,6)  | 12,5   | 48                         |

\*це рівень креатиніну у сироватці крові, розрахований відповідно до рекомендацій, і може точно не відповідати рівню зменшення функції нирок у всіх пацієнтів з нирковою недостатністю.

\*\* кліренс креатиніну, вирахований на основі площин поверхні тіла, або визначений.

Рекомендується ретельний клінічний нагляд за ефективністю та безпекою застосування.

*Рекомендовані підтримуючі дози цефтазидиму при нирковій недостатності – постійна інфузія*  
Дорослі та діти ≥ 40 кг маси тіла

| Кліренс креатиніну, мл/хв | Приблизний рівень креатиніну у сироватці крові, мкмоль/л (мг/дл) | Частота дозування (години)   |
|---------------------------|--|--|
| 50-31                     | 150-200<br>(1,7-2,3)   | Вводиться навантажувальна доза 2 г з наступним постійним інфузійним введенням від 1 до 3 г кожні 24 години |
| 30-16                     | 200-350<br>(2,3-4)   | Вводиться навантажувальна доза 2 г з наступним постійним інфузійним введенням 1 г кожні 24 години          |
| ≤ 15                      | > 350<br>(4-5,6)   | Не досліджувалося  |

Вибір дози слід проводити з обережністю. Рекомендується ретельний клінічний нагляд за ефективністю та безпекою застосування.

#### Діти □ 40 кг

Безпека та ефективність застосування Цефтадиму шляхом постійної врутрішньовенної інфузії дітям, маса тіла яких □ 40 кг, із порушенням функцією нирок не встановлені. Рекомендується ретельний клінічний нагляд за ефективністю та безпекою застосування.

Якщо дітям із порушенням функцією нирок необхідно застосувати препарат шляхом постійної внутрішньовенної інфузії, слід кліренс креатиніну скорегувати відповідно до площин поверхні тіла дитини або маси тіла.

#### Гемодіаліз

Період напіввиведення цефтазидиму із сироватки крові під час гемодіалізу становить від 3 до 5 годин. Після кожного сеансу гемодіалізу слід вводити підтримуючу дозу цефтазидиму, що рекомендується у таблиці, наведеній нижче.

#### Перитонеальний діаліз

Цефтазидим можна застосовувати при перитонеальному діалізі у звичайному режимі та при тривалому амбулаторному перитонеальному діалізі.

Крім внутрішньовенного застосування, цефтазидим можна включати до діалізної рідини (зазвичай від 125 до 250 мг на 2 л діалізного розчину).

Для пацієнтів із нирковою недостатністю, яким проводиться тривалий артеріовенозний гемодіаліз або високопоточна гемофільтрація у відділеннях інтенсивної терапії, рекомендована доза становить 1 г на добу у вигляді одноразової дози або за кілька прийомів. Для низькопоточної гемофільтрації слід застосовувати дози, як при порушені функції нирок.

Пацієнтам, яким проводиться веновенозна гемофільтрація та веновенозний гемодіаліз, рекомендації з дозування наведені у таблицях.

*Рекомендації з дозування цефтазидиму пацієнтам, яким проводиться тривала веновенозна гемофільтрація*

| Резидуальна функція нирок (кліренс креатиніну, мл/хв) | Підтримуюча доза (мг) залежно від швидкості ультрафільтрації (мл/хв) <sup>a</sup> |      |      |     |
|---|---|------|------|-----|
|   | 5   | 16,7 | 33,3 | 50  |
| 0   | 250   | 250  | 500  | 500 |
| 5   | 250   | 250  | 500  | 500 |
| 10  | 250   | 500  | 500  | 750 |
| 15  | 250   | 500  | 500  | 750 |
| 20  | 500   | 500  | 500  | 750 |

<sup>a</sup>Підтримуючу дозу слід вводити кожні 12 годин.

*Рекомендації з дозування цефтазидиму пацієнтам, яким проводиться тривалий веновенозний гемодіаліз*

| Резидуальна функція нирок (кліренс креатиніну, мл /хв) | Підтримуюча доза (мг) для діалізату при швидкості потоку (мл /хв) <sup>a</sup> |     |                                     |         |     |      |
|--|--|-----|-------------------------------------|---------|-----|------|
|  | 1 л/год  |     |                                     | 2 л/год |     |      |
|  | Швидкість ультрафільтрації (л/год)   |     | Швидкість ультрафільтрації (л /год) |         |     |      |
| 0  | 0,5  | 1   | 2                                   | 0,5     | 1   | 2    |
| 5  | 500  | 500 | 500                                 | 500     | 500 | 750  |
| 10   | 500  | 500 | 750                                 | 500     | 500 | 750  |
| 15   | 500  | 750 | 750                                 | 750     | 750 | 1000 |
| 20   | 750  | 750 | 1000                                | 750     | 750 | 1000 |

<sup>a</sup>Підтримуючу дозу слід вводити кожні 12 годин.

## Введення.

Цефтадим вводити внутрішньовенно ін'єкційно або інфузійно, або шляхом глибокій внутрішньом'язової ін'єкції. Рекомендованими ділянками для внутрішньом'язового введення є верхній зовнішній квадрант великого сідничного м'яза або латеральна частина стегна.

Розчини цефтазидиму можна вводити безпосередньо у вену або у систему для внутрішньовенних інфузій, якщо пацієнт отримує рідини парентерально.

Доза залежить від тяжкості захворювання, чутливості, локалізації та типу інфекції, а також від віку та функції нирок пацієнта.

Набута резистентність до антибіотика відрізняється у різних регіонах та може змінюватися з часом, а для окремих штамів може відрізнятися суттєво. Бажано використовувати місцеві (локальні) дані щодо чутливості до антибіотика, особливо при лікуванні тяжких інфекцій.

## Інструкція з приготування

Цефтадим сумісний з більшістю широковживаних розчинів для внутрішньовенного введення. Однак не слід застосовувати як розчинник натрію бікарбонат для ін'єкцій (див. «Несумісність»).

Флакони всіх розмірів виробляються під зниженим тиском. По мірі розчинення препарату виділяється діоксид вуглецю і тиск у флаконі підвищується. На невеликі бульбашки діоксиду вуглецю у розчиненому препараті можна не зважати.

| Доза, що вводиться |                         | Необхідна кількість розчинника (мл) | Приблизна концентрація (мг /мл) |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 250 мг             | Внутрішньом'язово       | 1                                   | 210                             |
|                    | Внутрішньовенний болюс  | 2,5                                 | 90                              |
| 500 мг             | Внутрішньом'язово       | 1,5                                 | 260                             |
|                    | Внутрішньовенний болюс  | 5                                   | 90                              |
| 1 г                | Внутрішньом'язово       | 3                                   | 260                             |
|                    | Внутрішньовенний болюс  | 10                                  | 90                              |
|                    | Внутрішньовенна інфузія | 50*                                 | 20                              |
| 2 г                | Внутрішньовенний болюс  | 10                                  | 170                             |
|                    | Внутрішньовенна інфузія | 50*                                 | 40                              |

\*Примітка. Розчинення слід проводити у два етапи (див. текст).

Колір розчину варіює від світло-жовтого до бурштинового залежно від концентрації, розчинника та умов зберігання. При дотриманні рекомендацій дія препарату не залежить від варіацій його забарвлення.

Цефтазидим у концентраціях від 1 мг/мл до 40 мг/мл сумісний з такими розчинами: 0,9 % розчин натрію хлориду; М/6 розчин натрію лактату; розчин Хартмана; 5 % розчин глюкози; 0,225 % розчин натрію хлориду та 5 % розчин глюкози; 0,45 % розчин натрію хлориду та 5 % розчин глюкози; 0,9 % розчин натрію хлориду та 5 % розчин глюкози; 0,18 % розчин натрію хлориду та 4 % розчин глюкози; 10 % розчин глюкози; 10 % розчин глюкози 40 та 0,9 % розчин натрію хлориду; 10 % розчин глюкози 40 та 5 % розчин глюкози; 6 % розчин декстррану 70 та 0,9 % розчин натрію хлориду; 6 % розчин декстррану 70 та 5 % розчин глюкози.

Цефтазидим у концентраціях від 0,05 мг/мл до 0,25 мг/мл сумісний з рідиною для інтраперitoneального діалізу (лактатом).

Цефтазидим для внутрішньом'язового введення можна розчиняти у 0,5 % або 1 % розчині лідокаїну гідрохлориду.

При використанні як розчинник розчину лідокаїну для внутрішньом'язового застосування препарату необхідно врахувати інформацію щодо безпеки лідокаїну.

Ефективність обох препаратів зберігається при змішуванні цефтазидиму у дозі 4 мг/мл з такими речовинами: гідрокортизон (гідрокортизону натрію фосфат) 1 мг/мл у 0,9 % розчині натрію хлориду для ін'єкцій або 0,5 % розчині глюкози; цефуроксим (цефуроксим натрію) 3 мг/мл у 0,9 % розчині натрію хлориду для ін'єкцій; клоксацилін (клоксацилін натрію) 4 мг/мл у 0,9 % розчині натрію хлориду для ін'єкцій; гепарин 10 МО/мл або 50 МО/мл у 0,9 % розчині натрію хлориду для ін'єкцій; калію хлорид 10 мекв/л або 40 мекв/л у 0,9 % розчині натрію хлориду для ін'єкцій.

Вміст флакона Цефтадиму 500 мг, розчинений у 1,5 мл води для ін'єкцій, можна додати до розчину метронідазолу (500 мг у 100 мл), при цьому обидва препарати зберігають свою активність.

*Приготування розчинів для внутрішньом'язової або внутрішньовенної болюсної ін'єкції*

1. Вколоти голку шприца через кришку флакона і ввести рекомендований об'єм розчинника.
2. Вийняти голку шприца та струсити флакон до отримання прозорого розчину.
3. Перевернути флакон. При повністю введеному поршні шприца вставити голку у флакон. Набрати весь розчин у шприц, при цьому голка весь час повинна бути у розчині. На маленьких бульбашки вуглекислого газу можна не зважати.

*Приготування розчинів для внутрішньовенної інфузії (флакони 1 г та 2 г)*

1. Вколоти голку шприца через кришку флакона і ввести 10 мл розчинника.
2. Вийняти голку шприца та струсити флакон до отримання прозорого розчину.
3. Не вставляти голку для повітря до повного розчинення препарату. Вставити голку для повітря через кришку у флакон для послаблення внутрішнього тиску у флаконі.
4. Не виймаючи голку для повітря, довести загальний об'єм до 50 мл. Вийняти голку для повітря, струсити флакон і налагодити систему для інфузій як зазвичай.

**Примітка.** Щоб забезпечити стерильність препарату, дуже важливо не вставляти голку для повітря через кришку до розчинення препарату.

#### **Діти.**

Застосовувати дітям з перших днів життя.

#### **Передозування.**

Передозування може привести до неврологічних ускладнень, таких як енцефалопатія, судоми і кома. Симптоми передозування можуть виникнути у пацієнтів із нирковою недостатністю, якщо не зменшити у них відповідно дозу (див. розділи «Способ застосування та дози» та «Особливості застосування»). Концентрацію цефтазидиму у сироватці крові можна зменшити шляхом гемодіалізу або перitoneального діалізу.

#### **Побічні реакції.**

**Інфекції та інвазії:** кандидоз (включаючи вагініт та афтозний стоматит).

**З боку системи крові:** еозинофілія та тромбоцитоз, лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія, лімфоцитоз, гемолітична анемія, агранулоцитоз.

**З боку імунної системи:** анафілаксія (включаючи бронхоспазм та/або артеріальну гіпотензію).

**З боку нервової системи:** запаморочення, головний біль, парестезії.

Повідомлялося про випадки неврологічних ускладнень, таких як тремор, міоклонія, судоми, енцефалопатія та кома у хворих із нирковою недостатністю, для яких доза цефтазидиму не була відповідно зменшена.

**З боку серцево-судинної системи:** флебіт або тромбофлебіт у місці введення препарату.

**З боку травного тракту:** діарея, нудота, блювання, біль у животі, коліт, порушення смаку.

Як і при застосуванні інших цефалоспоринів, коліт може бути пов'язаний з *Clostridium difficile* і може проявлятись у вигляді псевдомембранозного коліту (див. розділ «Особливості застосування»).

**З боку сечовидільної системи:** інтерстиціальний нефрит, гостра ниркова недостатність.

**З боку гепатобіліарної системи:** транзиторне підвищення рівня одного або кількох печінкових ферментів (АЛТ, АСТ, ЛДГ, ГГТ, лужна фосфатаза), жовтяниця.

**З боку шкіри:** макулопапульозний висип або крапив'янка, свербіж, ангіоневротичний набряк, поліморфна еритема, синдром Стівенса-Джонсона та токсичний епідермальний некроліз.

**Загальні та розлади у місці введення:** біль та/або запалення у місці внутрішньом'язової ін'екції, гарячка.

**Лабораторні показники:** позитивний тест Кумбса; як і при застосуванні деяких інших цефалоспоринів, інколи спостерігалося транзиторне підвищення рівня сечовини крові, азоту сечовини крові та/або креатиніну у сироватці крові.

Позитивна реакція Кумбса спостерігається приблизно у 5 % пацієнтів, що може впливати на визначення групи крові.

**Термін придатності.** 3 роки.

#### **Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °C в оригінальній упаковці.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

#### **Несумісність.**

Цефтазидим менш стабільний у розчині натрію бікарбонату для ін'екцій, ніж в інших розчинах для внутрішньовенного введення, тому він не рекомендується як розчинник.

Цефтазидим та аміноглікозиди не слід змішувати в одній інфузійній системі або шприці.

Спостерігалися випадки утворення осаду, коли до розчину цефтазидиму додавали ванкоміцин. Тому рекомендується промивати інфузійні системи та внутрішньовенні катетери між використанням цих двох препаратів.

#### **Упаковка.**

По 1 флакону у картонній упаковці.

**Категорія відпуску.** За рецептом.

**Виробник.**

Люпін Лімітед.

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**

198-202, Нью Індастріал Ерія № 2, Мандидип – 462046 Дист Райсен М.П., Індія.