

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
ВАЛЕРІАНИ НАСТОЙКА
(TINCTURA VALERIANAE)

Склад:

діюча речовина: 1 флакон містить настойки валеріани кореневищ з коренями (Valerianae rhizomata cum radicibus) (1:5) (екстрагент - етанол 70 %) - 25 мл або 30 мл;

Лікарська форма. Настойка.

Основні фізико-хімічні властивості: рідина червонувато-бурого кольору з характерним ароматним запахом.

Фармакотерапевтична група. Снодійні та седативні препарати. Код АТХ N05C M09.

Фармакологічні властивості.

Біологічно активні речовини, що містяться у коренях та кореневищах валеріани (ефірна олія, валеріанова кислота, борнеол, алкалоїди, дубильні речовини, цукри) зменшують процеси збудження у центральній нервовій системі, посилюють ефекти інших седативних, снодійних, аналгетичних та спазмолітичних засобів.

Клінічні характеристики.

Показання.

Функціональні розлади діяльності центральної нервової систем (підвищена емоційна збудливість, дратівливість, розлади сну), серцево-судинної системи (нейроциркуляторні дистонії).

Протипоказання.

Підвищена чутливість до біологічно активних речовин, що входять до складу препарату. Депресія та інші розлади, що супроводжуються пригніченням центральної нервової системи.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Валеріани настойка має здатність потенціювати дію серцевих, седативних, снодійних, аналгетичних та спазмолітичних засобів.

Особливості застосування.

Не слід порушувати рекомендації щодо застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат містить спирт етиловий, тому не рекомендується застосовувати його у період вагітності та годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

На період лікування пацієнтам, які приймають настойку, слід утримуватися від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами у зв'язку з вмістом у препараті спирту етилового.

Спосіб застосування та дози.

Приймати внутрішньо. Дорослим рекомендується приймати по 20-30 крапель настойки 3-4 рази на добу до досягнення стабільного лікувального ефекту, дітям віком від 12 років – із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3-4 рази на добу.

Діти.

Препарат містить спирт етиловий, тому не рекомендується застосовувати його дітям віком до 12 років.

Передозування.

При перевищенні рекомендованих доз препарату можливий розвиток виражених побічних реакцій: головний біль, запаморочення, сонливість або психічне збудження, загальна слабкість, біль у животі, нудота, тахікардія.

У разі передозування слід припинити застосування препарату і вжити заходів екстреної допомоги (промивання шлунка, введення активованого вугілля), симптоматичної та підтримуючої терапії відповідно клінічному стану хворого.

Побічні реакції.

Валеріани настойка, як правило, переноситься добре, проте у деяких хворих можуть спостерігатися пригнічення емоційних реакцій, сонливість, психічна депресія, зниження розумової та фізичної працездатності.

При індивідуальній підвищеній чутливості до препарату можливий розвиток місцевих алергічних реакцій (висипання, свербіж шкіри, почервоніння, гіперемія та набрякання шкіри).

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 25 мл або по 30 мл у флаконах.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

Державне підприємство «Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України».

Місце знаходження виробника та його адреса, місце провадження діяльності.

Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 15 а.