

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ІНСТЕНОН
(INSTENON®)

Склад:

діючі речовини:

1 таблетка містить гексобендинудигідрохлориду 20 мг; етамівану 50 мг;

етофіліну 60 мг;

допоміжні речовини: магнію стеарат тальк, лактози моногідрат, крохмаль кукурудзяний; оболонка: віск гірський гліколевий, повідон К 30, макрогол 6000, камедь акації, тальк, сахароза, титану діоксид (Е 171).

Лікарська форма. Таблетки, вкриті оболонкою.

Фармакотерапевтична група. Засоби, які впливають на центральну нервову систему. Код ATC N 07X X.

Клінічні характеристики.

Показання. Захворювання мозку судинного характеру, наслідки недостатності кровопостачання мозку, постінсультні стані запаморочення спричинені функціональними розладами мозку.

Протипоказання. Сильне нервове збудження і судомі, симптоми підвищеного внутрішньочерепного тиску (ознаки: тривалий головний біль, блювання, порушення зору), епілепсії, крововилив в головний мозок, підвищена чутливість до компонентів препарату.

Способ застосування та дози.

Зазвичай, рекомендується приймати по 1-2 таблетки 3 рази на день, не розжувуючи, під час або після їди, запиваючи невеликою кількістю рідини.

Тривалість курсу лікування повинна становити менше 6 тижнів.

Побічні реакції. В окремих випадках при прийманні високих доз можуть спостерігатися головний біль та гіперемія обличчя.

Передозування. Можливе посилення проявів описаних вище побічних реакцій.

У випадку передозування лікування симптоматичне.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Застосування можливе тільки в тих випадках, коли очікувана користь від лікування для матері перевищує можливий ризик для плода. За необхідності застосування препарату слід припинити годування груддю.

Діти. Клінічні дані щодо ефективності і безпечності застосування препарату Інстенон для лікування дітей відсутні.

Особливості застосування. Потрібно бути обережним, якщо нещодавно був інсульт, а також при стенозі сонної артерії, зумовленому атеросклерозом.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Клінічні дані відсутні.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.

При сумісному застосуванні препарату з хубстанціями що знижують активність тромбоцитів (наприклад, ацетилсаліциловая кислота), дія цих препаратів може посилюватися гексобендином.

Дуже великі дози кофеїну можуть послабити дію Інстеноу, тому потрібно утримуватися від вживання великої кількості кави та чаю.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Інстенон є комбінованим препаратом для поліпшення мозкового кровообігу та обміну речовин. Активні компоненти препарату діють у комплексі, одномоментно односпрямовано на різні ланки патогенезу ішемічного та ішемічного ушкодження нервової системи. Етаміван позитивно впливає на адаптаційні можливості ретикулярної формації стовбура мозку. При таких станах як ішемічний інсульт, постішемічнацефалопатія травма, інтоксикація, етаміван завдяки активації ретикулярної формації нормалізує функціональний стан нейронних комплексів кори і підкоркових стовбурових структур. Гексобендин підвищує утилізацію глюкози і кисню за рахунок активації анаеробного гліколізу і пентондих циклів. Така активація можлива тільки при ішемії і гіпоксії, коли порушується цикл аеробного окиснювання фосфориловання. Внаслідок стимуляції анаеробного окиснення утворюється енергетичний субстрат для синтезу й обміну медіаторів, нейротрансмітерів відновлення синаптичної передачі, депресія якої і деструкція мембрани нейронів є основним патогенетичним механізмом розладів свідомості і неврологічних порушень при гіпоксії та ішемії мозку. Гексобендин також стабілізує фізіологічні механізми ауторегуляції церебрального кровотоку, що пов'язано з дією лактату і пірувату (продуктів анаеробного гліколізу) на рецепторний апарат інтраекраніальних хартерій і капілярів.

Теофілін активує метаболізм міокарда зі збільшенням хвилинного об'єму крові, що сприяє збільшенню перфузійного тиску в судинах краєвої зони ішемії. При цьому не змінюється системний артеріальний тиск. Збуджуюча дія на нервову систему проявляється також у стимуляції підкоркових утворень, середнього мозку і стовбурових центрів та ядер (дихального, судиннорухового, центрів вегетативної регуляції, а також ядер черепно-мозкових нервів, у першу чергу, – блукаючого). При застосуванні Інстеноу випадках ішемічного інсульта, закритої черепно-мозкової травми відмічається відновлення порушенії свідомості пацієнта, регресія неврологічних порушень, активація вегетативної сфери.

Фармакокінетика. Не вивчалася.

Фармацевтичні характеристики.

Основні фізико-хімічні властивості: круглі, білі таблетки з гладенькою блискучою поверхнею, вкриті оболонкою білого кольору та з ядром білого кольору.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання. Зберігати у захищенному від світла, недоступному для дітей місці при температурі 5 – 25 °C.

Упаковка. 10 таблеток у блістері. По 3 блістери у картонній коробці.

Категорія відпуску. За рецептром.

Виробник. „Нікомед Австрія ГмбХ”, Австрія.

Місцезнаходження. Вул. Петер Штрасе 25, А-4020, Лінц, Австрія.