

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

МЕФЕНАТ
(MEFENAT)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: мефенаміну натрієва сіль, вінілін ;

100 г мазі містять мефенаміну натрієвої солі в перерахуванні на суху речовину 0,5 г, вініліну 10 г ;

допоміжні речовини: поліетиленгліколь (400), емульгатор №1, вода очищена.

Лікарська форма. Мазь.

Мазь білого або білого з жовтуватим відтінком кольору, зі слабким специфічним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПАТ «Фармак».

04080, Україна, м. Київ, вул. Фрунзе, 63.

Фармакотерапевтична група.

Засоби для лікування ран та виразкових уражень.

Код АТС D03A X.

Мефенаміну натрієва сіль, яка є головною діючою речовиною мазі, належить до нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ). Чинить протизапальну дію, перешкоджає утворенню та вивільненню з тканин медіаторів запалення (серотоніну, гістаміну, простагландинів, кінінів тощо), а також гальмує синтез активних форм кисню (перекису, гідроксильного радикалу тощо). Блокуючи переважно фермент циклооксигеназу-2 (ЦОГ-2), пригнічує проліферацію грануляційної тканини у вогнищі запалення, одночасно стимулюючи регенераторні процеси. Гальмує алергічні реакції гіперчутливості негайного та уповільненого типів. Чинить безпосередню дію при м'язовому та суглобовому болях, що перевищує такий ефект саліцилової кислоти. Підвищує рівень місцевого інтерферону та інших цитокінів.

Вінілін діє бактеріостатично, активуючи процеси епітелізації, прискорює загоєння ран.

Поєднання цих інгредієнтів призводить до посилення протизапальної, знеболювальної та ранозагоювальної дії мазі, пролонгування її ефекту. У результаті застосування мазі збільшується кількість лейкоцитів у рані і підвищується їх здатність до фагоцитозу.

Мазь діє переважно місцево, погано всмоктується через слизові оболонки та шкіру, практично не чинить резорбтивної дії. Тривалість ефекту може коливатися залежно від кількості гнійних мас і характеру інфекційних збудників на поверхні шкіри та слизових оболонок, рановій поверхні. У середньому терапевтична дія триває у межах 8-20 годин.

Показання для застосування.

Виразково-некротичні і запальні захворювання шкіри та слизових оболонок: екзофіативний хейліт, тріщини, що довго не загоюються, травматичні виразки губ, гострий та хронічний виразковий гінгівіт, афтозний стоматит, неспецифічні виразки ротової порожнини; карбункули, фурункули, гранулюючі рани, трофічні виразки, екземи, травматичні рани шкіри, опікові ушкодження, міозит, ревматоїдний артрит.

Протипоказання.

Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів мазі.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При тривалому лікуванні з обережністю застосовують пацієнтам із захворюваннями крові, нирок, а також на тлі застосування антикоагулянтів.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не досліджене.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Не застосовувати у педіатричній практиці.

Спосіб застосування та дози.

Мефенат наносити на ушкоджені ділянки шкірного покриву або слизових оболонок спеціальною скляною лопаткою, шпателем або за допомогою марлевих (ватних) тампонів (серветок) 1-3 рази на добу. Нанесені на змащені маззю ушкоджені ділянки шкіри накладати асептичну пов'язку.

Тривалість лікування – 7-15 днів, але у разі необхідності його можна продовжити.

Передозування.

Випадки передозування не описані.

Побічні ефекти.

При лікуванні ушкоджених слизових оболонок ротової порожнини можливі короткочасні прояви подразнення у місці нанесення мазі – почервоніння зони аплікації, відчуття печіння з наступним онімінням (легкий місцевий знеболювальний ефект), свербіж, набряк.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

При одночасному застосуванні із саліцилатами, похідними піразолону та іншими протизапальними засобами лікувальні ефекти сумуються, а анальгетична дія посилюється.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі від 8 °С до 15 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 15 г або 40 г у тубі. По 1 тубі у пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.