

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
СИЛІКС

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: субсил (кремнію діоксид);
1 пляшка містить - 12 г,
1 стик містить – 1 г,
1 пакетик містить – 1 г або 2 г.

Лікарська форма. Порошок для оральної суспензії.

Пухкий порошок білого або білого з блакитним відтінком кольору, без запаху.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ «БІОФАРМА».
Україна, 03680, м. Київ, вул. М.Амосова, 9.

Фармакотерапевтична група.

Ентеросорбенти. Код АТС А07В С10.

Препарат сорбційної дії. Шляхом абсорбції зв'язує та виводить з організму токсини екстерогенного та ендогенного походження, харчові і бактеріальні алергени, мікробні ендотоксини, токсичні продукти, що утворюються в процесі розпаду білків у кишечнику.

Препарат практично не всмоктується з кишечнику.

Показання для застосування.

Гострі кишкові захворювання, що супроводжуються діарейним синдромом (сальмонельоз, харчові токсикоінфекції); у комплексній терапії вірусних гепатитів А і В.

Протипоказання.

Індивідуальна підвищена чутливість до препарату. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалі кишки в стадії загострення, виразки та ерозії слизових оболонок тонкого та товстого відділів кишечнику, непрохідність кишечнику. Дитячий вік до 1 року.

Належні засоби безпеки при застосуванні.

Забораються застосування через рот сухого порошку. Перед кожним прийомом готову суспензію злегка збовтують.

Особливі застереження.

Застосування в період вагітності або годування груддю.

Не рекомендується застосовувати препарат у період вагітності або годування груддю у зв'язку з відсутністю даних про застосування.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти.

Не призначають дітям віком до 1 року у зв'язку з відсутністю даних про застосування.

Спосіб застосування та дози.

Препарат застосовують у вигляді водної суспензії, яку приймають внутрішньо за 1 годину до вживання їжі або застосування лікарських засобів.

Якщо хворий не може приймати ентеросорбент самостійно, суспензію Силікс вводять у шлунок через зонд.

Для приготування суспензії охолоджену кип'ячену воду в кількості 250 мл додають у пляшку, яка містить 12 г препарату (воду доводять до мітки на пляшці «250 мл» і злегка збовтують); 20 мл отриманої суспензії (повна столова ложка) містить приблизно 1 г препарату.

При використанні пакетованої форми препарат зі стика (1 г) або пакетика (1 г або 2 г) висипають у склянку, поїм до нього додають охолоджену кип'ячену воду з розрахунку 20 мл на 1 г препарату та злегка збовтують.

Добова доза препарату для дітей становить:

- дітям віком 1 – 3 роки – 1-2 г;
- дітям віком 4 – 7 років – 2-3 г;
- дітям віком 8 – 10 років – 4-5 г;
- дітям віком 11 – 13 років – 5-6 г;
- дітям віком 14 – 15 років – 7-8 г;
- дітям віком 16 – 18 років – 9-10 г.

Добова доза препарату для дорослих становить 12 г.

Добову дозу препарату у вигляді суспензії діти і дорослі повинні приймати у 3 прийоми.

Приготовлену суспензію слід зберігати при температурі від 2 °С до 8 °С не більше 24 годин.

При гострих кишкових захворюваннях лікування доцільно розпочинати з максимальної разової дози, яка не перевищує половину добової норми. Курс лікування – 3-5 діб; за необхідності може бути збільшений до 10 - 15 діб.

Курс лікування вірусних гепатитів у дозах, зазначених вище, становить 7-10 днів і залежить від тяжкості перебігу захворювання.

Передозування.

Про випадки передозування повідомлень не було. При прийомі препарату у завищених дозах може спостерігатись ускладнення випорожнення.

Побічні ефекти.

У поодиноких випадках можлива тимчасова затримка випорожнення.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

При одночасному застосуванні препарату та ацетилсалicyлової кислоти посилюється прогрес дезагрегації тромбоцитів. Силікс застосовують за 1 годину до вживання їжі або застосування інших лікарських засобів.

Термін придатності.

3 роки.

Приготовлена суспензія зберігається протягом 24 години при температурі від 2 °С до 8 °С.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 1 г препарату у стика або пакетика або по 2 г препарату у пакетика, або по 12 г препарату в пляшці. По 24 стики або 24 пакетики, або по 1 пляшці у пацці.

Категорія відпуску. Без рецепта.