

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату

**СОЛОДКИ КОРИНЬ**  
**(RADIX GLYCYRRHIZAE)**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* екстракт солодкового кореня густий (Liquiritiae radix)(3:1);  
1 г препарату містить екстракту солодкового кореня густого (3:1) 0,04 г;  
*допоміжні речовини:* вода очищена, етанол 90 %, цукор кондитерський.

**Лікарська форма.**

Сироп.

Густувата рідина бурого кольору зі своєрідним запахом.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

Комунальне підприємство «Луганська обласна «Фармація».  
Україна, 91020, м. Луганськ, Степовий тупик, 2,  
Фармацевтична фабрика КП «Луганська обласна «Фармація».

**Фармакотерапевтична група.**

Засоби, що застосовуються при кашлі і застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Код АТС R05C A.

Корені солодки голої містять гліциризин, калієву та кальцієву солі гліциризинової кислоти, флавонові глікозиди (ліквіритин, ліквіритигенін, ліквіритозид). Відхаркувальна дія препаратів солодки пов'язана з вмістом гліциризину, який стимулює активність війчастого епітелію трахеї та бронхів, посилює секреторну функцію слизових оболонок верхніх дихальних шляхів.

Спазмолітична дія препарату на гладкі м'язи дихальних шляхів зумовлена наявністю флавонових сполук, серед яких найактивнішим є ліквіритозид, протизапальний (кортикостероїдоподібний) ефект якого спричинений наявністю гліциризинової кислоти, що звільняється при гідролізі гліциризину.

**Показання для застосування.**

У комплексній терапії інфекційно-запальних захворювань дихальних шляхів, що супроводжуються утрудненим відходженням мокротиння та кашлем (гострі та хронічні бронхіти, трахеобронхіти, пневмонія, бронхоекстатична хвороба).  
Як допоміжний засіб при хронічному гіперацидному гастриті.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до препарату. Цукровий діабет, порушення функцій печінки та нирок, артеріальна гіпертензія, гіпокаліємія, тяжкий ступінь ожиріння.

**Належні заходи з безпеки при застосуванні.**

Сироп солодкового кореня містить цукор, тому його не можна рекомендувати хворим на цукровий діабет. Препарат містить спирт. Не рекомендується застосовувати препарат протягом тривалого часу.

**Особливі застереження.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Препарат протипоказаний у період вагітності, оскільки солодка гола підвищує рівень естрогенів, внаслідок чого порушується гормональний баланс. У разі необхідності прийому препарату протягом лікування годування груддю слід припинити.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Протягом застосування препарату слід утримуватися від керування автотранспортом та роботи з потенційно небезпечними механізмами.

**Діти.**

Дітям віком до 12 років препарат не призначати.

**Спосіб застосування та дози.**

Дорослим і дітям віком від 12 років застосовувати по 1 столовій ложці (15 мл) сиропу після їди 3-4 рази на день.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта з урахуванням ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

**Передозування.**

При передозуванні можливе посилення проявів побічних реакцій.

**Побічні ефекти.**

В окремих випадках можливі алергічні реакції, включаючи почервоніння шкіри, висипи, свербіж, набряк; порушення водно-електролітного балансу (поява набряків), підвищення артеріального тиску. Тривале застосування препаратів солодки у надмірних дозах може призвести до розвитку гіпокаліємії; в окремих випадках можливі гіпокаліємічна міопатія та міоглобінурія.

*У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!*

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Гіпокаліємія (у результаті надмірного застосування кореня солодки) може посилюватися при взаємодії з серцевими глікозидами, антиаритмічними препаратами та препаратами, які впливають на серцевий ритм (наприклад, хінідин). При сумісному застосуванні з препаратами, які зумовлюють розвиток гіпокаліємії (тіазидні та петльові діуретики, адренкортикостероїди та проносні лікарські засоби) може бути порушення електролітного балансу. Тому не слід застосовувати тривалий час Солодки кореня сироп одночасно з зазначеними вище лікарськими засобами.

*При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.*

**Термін придатності.**

2 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 50 г, 100 г, 250 г у флаконах; по 250 г у флаконі № 1 з дозуючим стаканом або без.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.