

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ТРАВІСІЛ® ЛЬОДЯНИКИ
(TRAVISIL® LOZENGES)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 льодяник містить комбінований екстракт рідкий (1:40) з наступної суміші лікарської рослинної сировини: листя адхатоди васики; плодів перцю довгого; плодів перцю чорного; кореневища імбиру лікарського; коренів солодки; плодів ембліки лікарської; кореневища куркуми довгої; кори акації катечу; насіння фенхелю звичайного; листя, насіння, коріння базилику священного; плодів терміналії чебула; плодів терміналії белеріки; кореневища калгану китайського; насіння, листя абруса прекаториус - 4,825 мг; ментол -2,0 мг;
допоміжні речовини: сахароза, глюкози розчин, олія апельсина або олія м'яти перцевої, або олія лимонна, або олія медова, вода очищена.

Лікарська форма. Льодяники.

Льодяники зі смаком апельсина: круглі льодяники від світло-оранжевого до темного коричнево-оранжевого кольору з витисненою буквою «Т» з обох боків, з неоднорідно пофарбованою поверхнею, мають приємний аромат та смак апельсина;

льодяники зі смаком лимона: круглі льодяники від світло-жовтого до темного коричнево-жовтого кольору з витисненою буквою «Т» з обох боків, з неоднорідно пофарбованою поверхнею, мають приємний аромат та смак лимона;

льодяники зі смаком м'яти: круглі льодяники від світло-зеленого до темного коричнево-зеленого кольору з витисненою буквою «Т» з обох боків, з неоднорідно пофарбованою поверхнею, мають приємний аромат та смак м'яти;

льодяники зі смаком меду: круглі льодяники від світло-коричневого до темно-коричневого кольору з витисненою буквою «Т» з обох боків, з неоднорідно пофарбованою поверхнею, мають приємний аромат та смак меду.

Льодяники з усіма смаками мають злегка нерівну поверхню, в карамельній масі є маленькі повітряні бульбашки у вигляді включень, що властиво лікарським формам із карамельної маси.

Назва і місцезнаходження виробника.

Плетхіко Фармасьютікалз Лімїтед.

Дхаравара, Каларія – 453001, Індор (М.П.), Індія.

Фармакоотерапевтична група. Комбіновані препарати, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Код АТС R05X.

Адхатода васика чинить відхаркувальну дію, запобігає блюванню.

Плоди перцю довгого – лікувальна рослина, що запобігає виникненню кашлю.

Плоди перцю чорного запобігають кашлю.

Кореневище імбиру лікарського застосовується при лікуванні хронічного кашлю, його рецидивів.

Коріння солодки – чинить відхаркувальну дію.

Плоди ембліки лікарської сприяють підвищенню захисних сил організму, тонізуючий засіб.

Кореневище куркуми довгої підвищує імунітет, застосовується для лікування кашлю та застудних захворювань.

Кора акації катечу – рослинний засіб, що усуває непримний запах з рота.

Насіння фенхелю звичайного впливає на процеси травлення, відхаркувальний засіб.

Листя, насіння, коріння базилику священного допомагає при кашлі та застуді.

Плоди терміналії чебула застосовуються при захворюваннях ротової порожнини.

Плоди терміналії белеріки застосовуються при кашлі та застуді.

Коріння калгану китайського - засіб для лікування хвороб горла, голосових зв'язок та інших захворювань дихальних шляхів.

Насіння, листя абрусу прекаториус усувають порушення з боку дихальної системи.

Ментол – антисептичний та відхаркувальний засіб, усуває непримний запах з рота.

Травісіл® сприяє розрідженню мокротиння, виводячи його з дихальних шляхів, контролює кашльовий рефлекс.

Допоміжні компоненти зменшують подразнення слизових оболонок ротової та носової порожнини.

Показання для застосування.

Кашель, що виникає при подразненні слизових оболонок верхніх та нижніх дихальних шляхів, при інфекціях дихальних шляхів, палінні.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Травісіл® містить цукрозу та глюкозу, що необхідно враховувати хворим на цукровий діабет, а також тим, хто дотримується низькокалорійної дієти.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Безпека застосування препарату у період вагітності або годування груддю не встановлена.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Зазвичай препарат не впливає, але у разі виникнення запаморочення слід уникати керування автотранспортом або роботи з іншими небезпечними механізмами.

Діти. Препарат протипоказаний дітям віком до 3 років.

Спосіб застосування та дози.

Застосовують внутрішньо.

Дорослі: 2-3 льодяники 3 рази на добу.

Діти віком від 3 років: 1-2 льодяники 3 рази на добу.

Курс лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування. Повідомлення щодо передозування відсутні.

Побічні ефекти.

З боку травного тракту: сухість у роті, біль у черевній порожнині, нудота, блювання, діарея.

З боку центральної нервової системи: головний біль, сонливість, тривога, безсоння, запаморочення.

Алергічні реакції: кропив'янка, везикулярні висипання, свербіж, ангіоневротичний набряк.

Інші: карієс, порушення смаку.

У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та обов'язково проконсультуватися з лікарем щодо подальшого терапії.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Слід уникати одночасного лікування іншими препаратами від кашлю, а також препаратами, що зменшують утворення мокротиння. Одночасне застосування з відповідним антибіотиком посилює ефект.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в сухому, захищеному від прямих сонячних променів та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

Упаковка.

По 8 льодяників у блістері; по 2 блістери вміщують у картонну коробку.

По 1 льодянику в поліетиленовій плівці. По 1 льодянику в поліетиленовій плівці, в пластиковому контейнері № 250, № 30.

Категорія відпуску. Без рецепта.